

Moll.

QL

425


.583

N45

1422

Richard W. Foster







HISTORIA  
MOLLUSCORUM  
SVECIAE

TERRESTRIVM ET FLUVIATILIUM

BREVITER DELINEATA

A

SVENONE NILSSON,


PROFESSORE REG.; IN ACAD. LUNDENSI ADJUNCT. ET  
MUSEI RER. NAT. PRAEFECTO; ACAD. SCIENT. HOLMIENSIS,  
REG. SOC. SCIENT. LITTERARUMQ. ELEG. GOTHOB. SOC.  
PHYSIOGR. LUND. MEMBRO; SOCIETATUM NAT. SCRUTATOR.  
WETTERAV. ET MARPURG. CORRESPOND.

---

LUNDÆ MDCCCXXII.

SUMTIBUS J. H. SCHUBOTHII, AULÆ REG. DAN. BIBLIOPOLÆ.

LITTERIS BERLINGIANIS.



VILHELMO FAXE,  
S. S. THEOL. DOCTORI, SCANIÆ ET BLEKINGIÆ  
EPISCOPO, ACADEMIÆ CAROLINÆ PRO-CAN-  
CELLARIO, REG. ORD. DE STELLA POLARI  
COMMENDATORI,  
SOCIETATIS PHYSIOGRAPHICÆ H. A. PRÆSIDI,  
VIRO  
LITTERARUM CULTU ET PATROCINIO  
ILLUSTRI

HOC PIETATIS MUNUSCULUM

SV. NILSSON.





## INTRODUCTIO.

**A**nimalia illa, quæ hodie *Mollusca* vocantur, diutissime investigata & collecta fuerunt. Scilicet inde a remotissimis temporibus homines jam animadvertabant, se ex illis utilitatem multifariam capere posse. Ex aliis itaque cibum, ex aliis margaritas aliaque ornamenta, ex aliis denique purpuram sibi pararunt. Quæ quidem, ni fallimur, in primis fuerunt caussis illorum investigationis. Postea vero, cum in varietatem rerum naturalium admirandam aliquantulum magis intenta fuit mens humana, Mollusca testacea, propter formas millemodis variantes & propter colores nitoremque elegantissimos, a Naturæ *Curiosis* assidue conquisita & asservata fuerunt. Qualicunque vero Collectioni disponendæ requiritur ordo quidam & modus. Sic orta est & diu servata Molluscorum Methodus ex formis testarum desumpta, immo ab ipso immortali nostro LINNÉ adoptata.

Pericula quidem nonnulla magis minusve felicia in animalibus ipsis, testarum incolis, cognoscendis, jam facta fuerant; sed, quantum scimus, clariss. O. F. MÜLLER, cognitione *Molluscorum terrestrium & fluviatilium*, omnibus antecessoribus præstitit. Proposuit sibi methodum fingere, in qua characteres generici ab ipsis animalibus tantum desumerentur.

Quam

Quamvis [vero hic procedendi modus, non minus quam ille, de quo jam diximus, unius tantum partis esse videatur; res tamen proposita illam vim habuit, ut magna novarum vel antea minus cognitarum specierum copia conquisita, & non solum testarum sed etiam incolarum ratione esset examinata & descripta. Inde ab hoc tempore studium Molluscorum a multis iisdemque eximiis ingeniis, in omnibus fere Europæ terris, maximo cum successu, excultum fuit. Species sedulo investigatæ, accurate descriptæ & eleganter delineatæ fuerunt, & Systema ipsum, antea rudis fere & indigesta moles, per illustrationem insignem, quam illi adtulit *Anatomia comparativa*, præsertim ultimo decennio, solidis & Naturæ convenientibus fundamentis fuit suffultum. Neque alia Zoologiæ pars tam penitus reformata est, quam hæc ipsa, quæ *Vermes* Linneanos complectitur.

Brevitati consulentes Viros consulto omittimus quorum studio & ingenio hæc omnia debentur, quos inter in anatomia comparata, ut in aliis multis, Illustriss. CUVIERUM principem veneramur.

At vero si de fastigio, ad quod hæc disciplina proximis abhinc annis, horum virorum industria, in aliis Europæ terris evecta est, statum ejusdem disciplinæ in patria nostra suspicimus; non possumus negare quin hoc studium, inde a temporibus immortalis LINNEI, in Svecia plane fuerit neglectum. Non ut aliis negligentiam exprobrarem, sed quo de hoc meo qualicumque specimine mitius judicium mi-



hi pararem, hæc monenda existimavi, quod nisi huiusmodi tentamen, in præsentī & donec melius habebimus, necessarium iudicassem, hoc opusculum nondum edidissem.

Inde enim ab ultima *Faunæ Svecicæ* (1761) & *Systematis Naturæ* (1767), a LINNÆO ipso adornata editione, ad *Mollusca* Sveciæ aut cognoscenda aut ordinanda, nihil fere in medium prodiit. Si enim *Helicem pomatiam* & *Unionem margaritifera*, in Opere periodico: *Svensk Zoologi*, de novo descriptas & delineatas, paucasque quasdam *Unionis* species, in Dissertatione Academica *Nova testaceorum Genera* sistente (Lundæ 1788), a celeberr. nostro A. J. RETZIO breviter adumbratas, exceperis; nulla omnino, quantum scimus, apud Nostrates exstat descriptio aut icon, ne unius quidem speciei, ad hanc animalium Divisionem pertinentis. Qualem reliquit à LINNÉ, talis adhuc apud nos restat, quamvis a Natura maxime abhorrens, horum Animalium systematica Dispositio. Triginta circiter speciebus in *Fauna Linneana* enumeratis, & quarum haud paucae dubiæ sunt, nullæ novæ additæ (de Svecicis tantum loquor), nullæ fere melius postea illustratæ.

Pro Scientiæ tamen integritate, magis adhuc fortasse quam pro synonymia Linneana illustranda, non minimi momenti videatur cognoscere quasnam Molluscorum species cum australi Europa communes, quasnam sibi proprias alat hæc borealis terra. Qui hac ratione opusculum nostrum conside-

siderare velit, id, sine dubio, non plane inutile aut superfluum judicabit. Neque tamen ii sumus, qui putemus nos completam enumerationem & perfectas descriptiones omnium, intra limites Sveciæ degentium specierum dedisse. Quamvis enim specierum numerus, triplo major descriptus inveniatur, quam qui in Fauna Linneana exstat; attamen credo, & huic meæ sententiæ non desunt rationes, patriam multa alere *Mollusca*, quæ adhuc delitescunt. Atque ingenue confiteor me nondum ad hoc opusculum, quod quam sit imperfectum ipse sentio, in medium proferendum adgressum fuisse, nisi amor hujus disciplinæ, in Juvenibus quoque nostris tandem, ut videtur, excitatus, omni auxilio ad hæc animalia cognoscenda caruisset. Nullum enim exstat enchiridium, *Mollusca* nostra breviter & eo Ordine complectens, quem præsens Scientiæ status poscere videatur. Multa sane sunt & egregia Exterorum de Molluscis opera; sed hæc partim magis exoticas quam nostras species tractant, partim apud nos rara sunt & pro tirone sæpe nimis sumtuosa.

Quæ cum ita sint, non dubito, quin eam saltem hoc meum periculum adferat utilitatem, ut Operi, *Mollusca* nostra melius & perfectius tractanti, eliciendo olim inserviat. Quod si factum fuerit, non me, quasi frustra laborassem, pœnitebit.

Decennium circiter est cum *Mollusca* nostra in excursionibus & itineribus obvia colligo, paucos tantum annos in rem studiosius intentus. Hoc autem  
tem-

temporis spatio partim ipse quasdam Patriæ plagas iterum requisivi, partim ab amicis hujusmodi animalcula, undique fere collecta accepi. Quos inter summa cum gratiarum actione nominare debeo: A. A. *Retzium*, *Med. Drm*, qui in alpestribus Jemtlandiæ & Norvegiæ iter pro Historia Naturali faciens, Mollusca quoque collegit, eademque mecum benigne communicavit: C. H. *Boheman*, Subcenturionem, qui in Smolandica & Westrogothica inquisivit, & de hisce locis multa mihi exoptata impertivit: G. *Marklin*, *Hist. Nat.* Studiosum, qui Uplandica specimina misit: A. *Bruzelium* & B. F. *Fries* *Cand. Phil.*, qui Bahusiensia, Oelandica & Scanensia, atque *Landgren* & *Sundewall*, qui exemplaria in Scania collecta dederunt.

Jam restat ut pauca disseram de modo, quo in hoc enchiridio elaborando procedere debere mihi visus sum. Credidi scilicet meum fuisse omnia illa, quæ ad tironem instruendum facerent, copiosius tractare, sed brevitatem in iis potissimum servare, quæ illi nulli essent usui. Effusa igitur & copiosa synonymia volumen libri augere consulto evitavi. Præter *Faunam* itaque *Svecicam* LINNÆI, quippe quæ Mollusca complectitur collecta in iisdem regionibus ac nostra, & *Historiam Vermium* MÜLLERI, Mollusca terræ vicinæ pertractantem, non fere citavi nisi novissimos & optimæ notæ Scriptores, quos quidem noverim. Hi vero sunt:

J. Ph. R. DRAPARNAUD, *Histoire Naturelle des Mollusques de la France.* Paris 1805.

C.



C. PFEIFFER, *Systematische Anordnung und Beschreibung deutscher Land- und Wasser-Schnecken*. Cassel 1821.

J. STURM, *Deutschlands Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen*. Sectionis sextæ fasciculus 1-3.

Qui quidem omnes figuris optimis & plerumque egregiis res descriptas illustrarunt.

De LAMARCK, *Histoire naturelle des animaux sans vertèbres*. Tom. V—VI. Paris 1818—1822.

Quod quidem Opus, si universam Molluscorum doctrinam respexeris, omnium a me cognitorum maxime completum est.

Doleo tamen me non potuisse citare aut in meam utilitatem conferre excellentissimum & elegantissimum Opus: *Histoire naturelle générale & particulière des Mollusques terrestres & fluviatiles* &c. par D'AUDEBARD Baron de FERUSSAC. Paris 1819 &c.

Hoc vero præciosissimum Opus videre mihi non contigit, cum in Bibliotheca nostra Academica, ut alia multa optimæ notæ opera, desideretur, & rei familiaris ratio illud mihi comparare nondum permiserit.

Nullas, ne novarum quidem specierum figuras dedi, ne librum sumtuosum redderem. Cum vero, ad species subsimiles rite dignoscendas, Descriptio vel maxime completa nonnunquam parum sufficiat; omni Molluscorum studioso e re est, ut aditus ad icones illi pateat. Inter omnia igitur a me visa Exterorum de Molluscis opera, Librum Clar. PFEIFFERI, jam laudatum, eam ob causam Juvenibus nostris præcipue com-

commendo, quia continet plurimas species Svecanas, & facile procurari potest, atque pro copia bonitateque figurarum modico pretio venditur.

In describendis Molluscis *terminos artis* usu vulgari receptos, semper fere adhibui. Hi vero jam dudum explicati sunt in libris etiam vernacula lingua conscriptis vel in eandem translatis, ex. gr. *Inledning till Djurriket af A. F. Retzius. Stockh. 1772.*

J. C. ILLIGERS *Försök till en fullständig systematisk terminologi. Öfversatt och tillökt af G. Marklin. Upsala 1818.*

Paucissimi præterea termini, a cel. DRAPARNAUD mutuati, explicatione vix egent. At nonnullis iisdemque verbis alii Scriptores aliam subjiciunt significationem; quare quo modo in hoc nostro opusculo explicentur, paucis indicare debeo. In testis igitur *univalvibus* strias, fascias &c. *longitudinales* eas dico quæ longitudinem anfractuum sequuntur, easque *transversas* appello, quæ anfractus transversim ornant. Nam unaquæque testa spiralis re vera est conus, magis vel minus elongatus & circa lineam, quæ axem testæ format & *columella* appellatur, contortus. Apud plurimos Scriptores illæ striæ longitudinales audiunt, quæ a vertice ad basin testæ rectâ decurrunt, nulla anfractuum habita ratione. — In testis *bivalvibus* describendis, multo etiam magis inter se dissentiunt Auctores de usu nonnullorum artis terminorum. Qui vero quamnam significationem in hoc nostro

stro

stro libro habent, ex iis quæ breviter asseram, satis, ut credo, elucebit: Cum animal, testa bivalvi munitum, fundo plano incedit, illa conchæ pars, in qua nates & ligamentum sita sunt, *sursum* vergit. *Nates* vero quoque, & fortasse rectius, *Vertex* testæ appellantur, quia vertici testæ univalvis absque spira respondent. Totus itaque hic *margo*, ab una ad alteram extremitatem *superior* mihi audit; pars vero natibus & ligamento opposita, ubi pes in plurimis exseritur, incedente animali *deorsum* vergit & pars *inferior* appellatur. Hi duo margines extremitatibus utrinque terminantur, quarum una *anterior*, altera *posterior*. In illa extremitate inter quam & nates *Ligamentum* situm est, pallii aperturæ duæ, interdum in Siphones extensæ, inveniuntur, quarum altera *anterior*, altera *tracheæ* vicibus fungitur. Infra extremitatem oppositam *pes* animalis ingredientis protenditur, & in eadem hacce testæ extremitate *os* animalis conditur. Hæc igitur extremitas *anterior* appellatur, illa vero *posterior*. Testa vero in situ descripto ante me posita, extremitateque anteriori antrorsum vergente, quænam *valva dextra* sit, quænam *sinistra* videre, facillimum est.

MOLLUSCA disposituri, ad normam Excell. CUVIERI, Classes ceterasque Divisiones superiores definivimus. In Generibus vero fingendis Cel. LAMARCKIUM, Natura tamen duce, plerumque sumus secuti. VERTIGINEM Mill. a PUPA Drap. separare non potui, quamvis



vis illius animal bicornæ, hujus quadricornæ sit. In Generibus enim construendis non solum animal verum etiam testa consulenda est. At vero inter testam VERTIGINIS & PUPÆ nulla tam distincta & constans differentia nobis sese offert, ut in diversa Genera abire jure videantur. Clar. quidem MÜLLER *Vertiginem* a ceteris suis generibus separavit, principio suo indulgens, non nisi *Animal* in Generibus constituendis esse respiciendum. At vero si sibi semper consentaneus fuisset, UNIONEM ab ANODONTA (MYTILUM a MYA Mill.), quippe quorum animalia plane similia sunt, nullo pacto separasset. Nos vero, quibus persuasum est, nullam differentiam *essentialem* in animali quocunque obvenire, quæ vim suam in testa formanda non excerceat, jure nostro assumere nobis videmur, illam differentiam quæ intercedit inter animalia *Vertiginis* & *Pupæ*, & quæ sola in tentaculis inferioribus aut brevissimis aut obsoletis & inconspicuis constat, minime esse *essentialem*. In speciebus enim unius ejusdemque Generis, tentacula non raro quoad longitudinem differunt.

Non nisi unum, & Natura quidem urgente, AMPHIPEPLÆ Genus, proposuimus, in quo construendo nobis sine dubio antevertisset cel. LAMARCK, si typum hujus Generis ante oculos habuisset. Cel. DRAPARNAUD speciem quidem, sed ita, præsertim quoad animal, descripsit, ut suspicari liceat ipsum illud nunquam vidisse. Nec testam depinxit, quamvis in præfamine (p. III.) dicat se omnes, quas descripsit, species delineasse.

De

*De Molluscorum per Europam distributione :*

Sua cuique animali terræ plaga, eaque vel angustior vel latior, pro habitaculo cessit, ejus limites non impune transit. Hæc autem lex, exceptionibus quamvis obnoxia, in universum tamen valere videtur, ut quo quæque species magis ex cœlo & aëre pendet, eo angustioribus circumscribatur habitandi limitibus; nisi si, pro varia anni tempestate, variam terræ plagam petere possit. Quo vero minus aëri obnoxia animalia sunt, eo longius dispergita sub vario cœlo vitam agunt. Quæ quidem lex de Molluscis quoque nostris valere videtur. Eadem enim *Mollusca fluviatilia*, tum *Gasteropoda* tum *Acephala*, omni Europæ, ab Alpibus saltim Pyrenæis, usque ad ultima septentrionis Scandinavici Juga communia sunt. At species aliæ lacus, aliæ flumina, aliæ torrentes rivos potissimum amant; aliæ sunt maxime vulgares & ubique catervatim obviæ, aliæ multo ubique rariores sunt & individuis valde paucioribus continentur.

Neque tamen hæc regula de generali horum animalium per totam Europam distributione, exceptionibus suit caret. Verosimile enim videtur, magnam dissimilitudinem medii illius, in quo vivunt Mollusca, dissimiles generare & alere species. Sic mare balthicum, quod, quoad salsitudinem aquæ, medium quasi est inter mare & lacum, proprias quasdam species habet, quæ in nullo alio Scandinaviæ loco obveniunt. Eadem ratio thermarum & fontium salsarum esse videtur; (quibus tamen in patria nostra  
pla-

plane caremus). Sed hæ exceptiones, quæ sine dubio paucæ sunt & cœli varietati minime debentur, legem vix tollunt.

*Mollusca* quoque *terrestria* Europæ meridionali & boreali magis communia sunt, quam fortasse putares. Quis enim exspectaret se in Hallandia reperiturum esse *Clausiliam papillarem*, antea, quantum scimus, non nisi in Italia & Gallia inventam; aut in Scania *Helicem pygmaeam*, antehac tantum ad Lyonam Galliæ observatam! Aut quis opinatus fuisset *Helicem fulvam*, *rotundatam*, *pulchellam* &c. *Bulimum lubricum*: plures *Clausiliæ* & *Pupæ* species, in alpibus Jemtlandiæ ceterique Septentrionis, non minus quam in campis & sylvis Galliæ habitare!

Quæ vero, quamvis ita sint, observator tamen diligens majorem discrepantiam inter *Mollusca terrestria* quam *fluvialia*, in distantibus Europæ regionibus, facile reperiet. Neque hoc mirum aut a sententia physiologorum antecepta, ut arbitramur, alienum. Etenim necesse fuit, ut *Mollusca terrestria*, quæ in herbis, arboribus aliisque rebus editioribus vitam sæpius agunt, ex cœli varietate magis penderent, quam *fluvialia*, quæ in aqua continue degunt. Mirum sane sed verum est, majores species cujusvis Generis prius boream versus desinere, quam minores. Sic *Helix Pomatia* nullibi apud nos reperitur, nisi in illis hortis, ubi hominum ope apportata fuerit; atque post tam multas & sedulas investigationes, jure nostro contendere videmur, ceteras *terrestrium* majores species, ex. gr. *Bulimum decollatum*, *radiatum*,  
acu-

*acutum*, &c.: *Helicem rhodostoma*, *melanostoma*, *Naticoidem*, *vermiculatam*, *Algiram*, aliasque nonnullas, quæ Europam meridionalem incolunt, in borealibus nostris terris plane desiderari. Eandem quoque discrepantiam inter Scaniam & Lapponiam hoc respectu invenimus. Scilicet ex illa in hanc provinciam profecturi, species cujusque Generis, quo majores sunt eo prius frustra quæremus, & tandem, in ipsis alpestribus plagis, non nisi minimæ nobis restabunt.

### *De Molluscis Sveciæ fossilibus.*

Mollusca *petrefacta* terrestria aut fluviatilia, ad species jam demortuas pertinentia, apud nos nunquam inventa sunt. Quæ fossiles obveniunt species adhuc vivunt. Tales sunt, ex. gr. *Helix fruticum* & *Helix strigella* in strato calcis tophosæ (*Tuffkalk*) ad Benestad Scaniæ, & plurimæ *fluviatilium* species in terra turfosa (*Torfjord*) passim frequentes obviæ; quas inter præsertim *Planorbis*, *Lymnææ*, *Paludinæ*, *Valvatæ*, interdum quoque *Cyclades* numerandæ sunt. Omnia *Mollusca* vere *petrefacta*, quæ in tellure Svecana occurrunt, marinæ sunt originis & a proposito nostro præsentia aliena.



\*                      \*

\*                      \*

# REGNUM ANIMALE.

ABIT IN

QUATTUOR DIVISIONES PRINCIPALES,

QUARUM CONTINET

DIVISIO SECUNDA

ANIMALIA MOLLUSCA. CUV.

*Animalia* vertebris & articulis destituta; circulatione humorum duplici, corde peracta; organis respirationi peculiaribus; medulla nervea simplici (non nodosa). — Corpus gelatinosum, palio ut plurimum cinctum, aut nudum aut testa vestitum.

*Animalia Mollusca*, CUVIER Regne animal, I. p. 58. II. p. 351. — SCHWEIGGER, Naturgesch. der skelettlos. ungeglid. Thiere p. 689. — Skand. Fauna I. p. XXIII.

---

DIS-

# DISPOSITIO SYSTEMATICA

MOLLUSCORUM SPECIE TERRESTRIVM ET FLUVIATILIVM.

CLASSIS I. MOLLUSCA GASTEROPODA. CUV.

*Mollusca* capite tentaculato, oculifero; corpore oblongo, disco longitudinali muscoloso repente; testa univalvi aut nulla.

ORDO I. GASTER. PULMONATA. CUV.

MOLL. vesicâ pulmonaceâ, ostiolo ex arbitrio clausâ vel apertâ, aërem respirantia. Hermaphrodita, per coitum se propagantia.

*Testa* nulla aut (plerisque) spiralis.

FAMILIA I. GASTER. PULMONATA TERRESTRIA.

MOLL. extra aquam continuo viventia; tentaculis cylindraceis retractibus instructa; operculo proprio destituta, spurio hibernantia interdum munita.

*Obs.* Phytophaga sunt; vescuntur enim herbis, foliis, fungis, baccis &c. Circumvallata & alimentis orbata, papyrus aliasque ad nutriendum ineptas res comedunt.

\*\* *Tentaculis quattuor, superioribus duobus majoribus, apice oculiferis; inferioribus interdum brevissimis, raro plane evanescentibus.*

a) *Corpore per totam longitudinem cum pede conjuncto.*

1. LIMAX p. 1.

*Animal* oblongum, corpore anterieus clypeato, aperturis ani & vesicæ pulmonacæ in dextro clypei latere conjunctis.

*Testa* nulla.

b) *Corporis parte posteriore a pede distincta, spirali-ter contorta & testa vestita.*

2. VITRINA p. 10.

*Animal* pallio antice producto, dextrorsum appendiculato.

*Testa* subdepressa, tenuissima, imperforata; apertura rotundato-lunata, margine columellari arcuatim exciso.

3. HELIX p. 13.

*Animal* pallio haud producto, appendice supra testam reflexa nulla.

*Testa* subglobosa vel depressa; apertura transversa, semilunari.

4. BULIMUS p. 36.

*Animal* ut præcedentis.

*Testa* ovata vel oblonga, anfractu ultimo majori quam penultimo; apertura longitudinali, marginibus inæqualissimis; columella basi integra.

5. ACHATINA p. 38.

*Animal* fere ut præced.

*Testa* oblonga, apertura longitudinali, ad columellam, basi truncatam, sinuosa; peristomate acuto.



6. SUCCINEA p. 41.

*Animal* tentaculis brevibus, superioribus a basi ad medium incrassatis.

*Testa* ovata, apertura magna, longitudinali, edentula; columella lævi, basi integra; peristomate acuto.

7. CLAUSILIA p. 42.

*Animal* tentaculis inferioribus brevissimis.

*Testa* fusiformis, gracilis; apertura sinistrorsa pyriformi vel ovata; peristomate continuo reflexo; faucibus ossiculo clausis.

8. PUPA p. 48.

*Animal* tentaculis inferioribus brevissimis aut nullis.

*Testa* cylindracea anfractu ultimo non majori penultimo; apertura semiotunda, plerisque dentata.

\*\* *Tentaculis duobus basi oculiferis.*

9. AURICULA p. 54.

*Animal* tentaculis obtusis, basi postice oculiferis.

*Testa* oblonga, apertura longitudinali, integra, dentata.

FAMILIA II. GASTER. PULMONATA AQUATILIA.

MOLL. in aqua viventia, aërem, supra aquæ superficiem per intervalla haustum, respirantia; tentaculis duobus contractilibus, basi oculiferis; operculo nullo.

10. *Physa* p. 55.

*Animal* tentaculis longis setaceis, basi intus oculiferis.

*Testa* oblonga vel ovalis, apertura sinistrorsa, longitudinali, superne angustata.

11. *AMPHIPEPLEA* p. 58.

*Animal* tentaculis triangularibus, compressis, basi antice oculiferis; pallio testam involvente.

*Testa* subglobosa; spira obtusissima vix prominula.

12. *LYMNEA* p. 60.

*Animal* tentaculis triangularibus compressis, basi antice oculiferis; pallio testâ condito.

*Testa* oblonga; spira exserta, acuta; apertura longitudinali; columella plica oblique adscendente.

13. *PLANORBIS* p. 73.

*Animal* tentaculis setaceis; basi intus oculiferis.

*Testa* disciformis; apertura fere lunata.

14. *ANCYLUS* p. 83.

*Animal* tentaculis subulatis, obtusis, basi intus oculiferis.

*Testa* absque spira, oblique conica, vertice recurvo.

ORDO II. GASTER. PECTINIBRANCHIATA. Cuv.

MOLL. in aqua continue degentia; branchiis pectiniformibus aquam respirantia. Tentacula duo. Os proboscideum. Sexus distincti.

*Testa* spiralis, operculata.

15. VALVATA p. 85.

*Animal* tentaculis setaceis, basi postice oculiferis; filo branchiali, tertium tentaculum mentiente, & branchiis exsertilibus.

*Testa* discoidea vel conoidea; cavitate spirali & apertura rotundatis, integris; peristomate continuo.

16. PALUDINA 88.

*Animal* tentaculis setaceis basi extus oculiferis; branchiis cavitate propria conditis.

*Testa* ovata vel conoidea; cavitate spirali ab anfractu proximo subexcisa; apertura superne angulata, peristomate continuo.

17. NERITINA p. 93.

*Animal* tentaculis setaceis, basi extus oculiferis.

*Testa*



*Testa* semiglobosa, subtus planulata, apertura semirotunda.

---

CLASSIS II. MOLLUSCA ACEPHALA. Cuv.

*Mollusca* aquatilia, capite nullo, ore inermi, branchiis quattuor foliaceis inter corpus & pallium sitis; pede exsertili linguæformi vel subtereti elongato. Hermaphrodita, sine coitu se propagantia.

*Testa* bivalvis, corticata, æquivalvis; ligamento cardinali externo.

18. CYCLAS p. 95.

*Animal* pede elongato, subtereti; siphone aut duplici longo, aut simplici brevi.

*Testa* clausa subrotunda vel subovata, dentibus cardinalibus minutis, lateralibus utrinque lamellosis.

19. UNIO p. 102.

*Animal* pede valido, linguæformi; siphonibus brevibus.

*Testa*

*Testa* subhians, transversa, dente cardinali abbreviato & laterali infraligamentali, lamelloso, valvula altera duplicatis.

20. ANODONTA p. 113.

*Animal* pede valido linguæformi; siphonibus brevissimis.

*Testa* subhians transversa; cardine edentulo.



## I. LIMAX, Linn.

*Animal* oblongum, nudum, dorso antèrius pallio scutiformi (*clypeo*), cavitatem pulmonalem tegente; corpore subtus disco longitudinali plano; apertura pro respiratione & ano in dextro clypei latere; tentaculis quatuor retractilibus, superioribus binis majoribus apice oculiferis.

*Testa* externa nulla.

\* *Clypeo* granuloso; dorso postice convexo; apertura laterali subantica.

### 1. *Limax ater*.

*L. niger*, *clypeo* granuloso postice rotundato; dorso sulcis striisque abruptis rugoso; limbo lineis transversis striato; apertura laterali antica.

Longit. 10-12. centim. Latit. 22-24 millim.

*Limax ater*, Linn. Faun. Svec. p. 507. n. 2088. — Syst. Nat. p. 1081. n. 1. — Müll. Verm. hist. p. 2. — Draparn. Moll. terrest. & fluviat. p. 122. t. 9. f. 3-5. — Sturm Faun. Germ. VI. 1. cum fig. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 19.



*Variet. α. Aterrimus, subtus medio pallidus.*

— *β. Niger, limbo coccineo.*

— *γ. Niger, limbo & ore intus aurantiis.*

— *δ. Saturate fuscus, limbo lutescente.*

*Animal* crassum, atrum vel nigro-fuscum. Clypeus antice & postice rotundatus, punctis elevatis confertis adpersus. Apertura lateralis magna, ante medium clypei sita. Collum supra lineis longitudinalibus parallelis. Dorsum convexum, longitudinaliter abrupte sulcatum & striatum; striis rugosis. Limbus, sive margo pedis, prominens, lineis parallelis transversis striatus. Postice inter dorsum & limbum porus mucum secernens, plicis transversis prominentibus tectus. Tentacula crassiuscula, superiora fere subulata, apice in globulum incrassato.

*Habitat* locis umbrosis & subhumidis, in sylvis vulgaris. In Scania campestri rarius ex. gr. ad calcifodinam Östra Torp, loco aprico, repertus.

## 2. *Limax albus.*

*L. albus, tentaculis & limbo interdum coloratis; clypeo granuloso; dorso sulcato, rugoso.*

*Limax albus*, Müll. Verm. hist. p. 4. — Lamarck Hist. Anim. s. vert. VI. 2. p. 50.

*Variet. α. Totus albus.*

— *β. Albus limbo flavo.*

— *γ. Albus tentaculis nigris.*

*Animal* magnitudine præcedentis, cui, præter colorem constanter album, simile est. *Variet. γ. minor,*  
circa

circa 30 millim. albidus, superne subcoerulescens; capite & tentaculis nigris. Limbus albidus lineis transversis subnigris. Apertura lateralis nigro marginata.

*Habitat* in sylvis densis umbrosis & subhumidis, rarissime. Var.  $\alpha$  &  $\beta$ . in Hallandia ad Fröllinge:  $\gamma$  in Scania ad Esperöd invenimus.

### 3. *Limax rufus*.

*L. rufus*, clypeo granuloso, postice rotundato; dorso sulcis & striis abruptis rugoso; apertura laterali antica.

*Limax rufus*, Linn. Faun. Sv. p. 507. — Syss. Nat. p. 1081. n. 3. — Draparn. Moll. p. 123. t. 9. f. 6. — Sturm Fauna VI. 1. cum fig. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 19.

*Animal* quoad magnitudinem & formam præcedentes refert; color vero semper supra rufus limbo luteo-rufo, subtus albidus. Clypeus punctis confertis subscaber. Dorsum striis abruptis rugosis, sulcis saturationibus distinctis. Limbus prominens. Tentacula nigricantia. Apertura lateralis magna, ante medium clypei sita. Mucus, quem pressus exsudat, luteus.

*Habitat* in sylvis umbrosis, rarius.

### 4. *Limax fasciatus*.

*L. clypeo granuloso; apertura laterali subantica; tentaculis & fascia utrinque clypei & dorsi nigricantibus.*

Longit. 3-5 centim.

Va.

*Variet. α. Albidus, tentaculis & fascia utrinque nigricantibus.*

— *β. Albius, capite & tentaculis nigris; fascia utrinque obsoleta fusca.*

— *γ. Supra pallide cinereus, fascia utrinque, capite & tentaculis nigris; lateribus & corpore subtus albis.*

— *δ. Cæruleus, clypeo griseo, fasciis lateralibus & capite cum tentaculis nigris.*

— *ε. Luteo-brunneus dorso cinerascens; fascia clypei & dorsi utrinque nigricante. Tentaculis & linea colli utrinque nigris.*

— *ζ. Luteo-rufus, fasciis lateralibus, capite & tentaculis fuscis.*

— *η. Subrufus, dorso obsolete variegato; fascia clypei & dorsi utrinque nigris.*

*Observ.* Videtur *Limax subfuscus*, Draparn. Moll. p. 125. t. 9. f. 8. — Pfeiff. l. c. p. 20. — ad unam vel alteram hujus speciei varietatem pertinere; at vero color subfuscus minime constans, fasciæ autem semper & in omnibus varietatibus reperiuntur. Præterea *Limax* a cel. Drap. depictus multo major est quam noster.

*Animal* inter minores sui generis species numerandum. Clypeus, postice rotundatus, punctis elevatis confertis, striisque irregularibus adspersus. Dorsum granulato-striatum. Tentacula & plerumque totum caput nigra. Fascia longitudinalis in clypeo & dor-

dorso utrinque fusca vel nigra. Apertura lateralis *sub* fascia lateris dextri, aliquantulum ante medium clypei. Dorsum teres, lineâ longitudinali media, pallida, subelevata, animale contracto & quieto tantum conspicuâ. Hæc linea quæ, animale incedente, plane evanescit, a carina illa dorsali, quæ species divisionis sequentis notat, valde differt.

Varietas maxime vulgaris hoc gaudet colore: Clypeus cinereus rufescens, fascia utrinque fusca. Dorsum pallide cinereum vel cærulescens fascia utrinque fusca, quæ antice *sub* fascia clypei incipit. Lateralia alba, rufo magis vel minus tincta, qui color etiam occupat partes corporis inferiores, præsertim antice. Mucus, quem pressus exsudat, luteus est.

*Habitat* in sylvis & hortis inter folia humida putrida, vulgaris. In hortis ad Lund frequens.

## 5. *Limax flavus*.

*L. flavus*, capite & tentaculis nigricantibus; clypeo granuloso, apertura laterali antica.

Long. 25 - 30. millim.

*Limax flavus*, Müll. Verm. hist. p. 10. n. 208.

*Variet. α. Flavus* capite & tentaculis nigris.

— *β. Albidus*, clypeo & corpore subtus subluteis, capite & tentaculis nigricantibus.

— *γ. Pallidus*, clypeo flavo, dorso subcinerascens.



*Animal* pollicare inter minimas hujus generis species. Clypeus granulatus, flavus. Dorsum granulato-striatum, rugosum, flavum vel albidum, vel subcinerascens. Apertura lateralis ante medium clypei. Caput & tentacula nigricantia. Corpus subtus subflavum. Mucus flavus uberrimus.

*Habitat* in sylvis inter folia putrida, passim. Ad *Esperöd* Scaniae haud raro. — In Smolandia. Nob. *Boheman*.

\*\* *Clypeo lineis subcircularibus, confertis striato; dorso postice carinato; apertura laterali subpostica.*

## 6. *Limax cinereus*.

*L. cinereus vel fusco-griseus, maculatus vel immaculatus; clypeo striis subcircularibus, postice angulato; dorso striato-rugoso; apertura laterali sub-postica; corpore postice triquetro, carina rugosa.*

Longit. 120 - 140 millim.

*Limax cinereus*, Müll. Verm. hist. p. 5. — Sturm Fauna VI. 2. cum fig. — Draparn. Moll. terr. & fluv. p. 124. t. 9. f. 10. — Pfeiff. Land- und Wassersehn. p. 20.

*Limax maximus*, Linn. Fn. p. 507. — Syst. Nat. p. 1081. n. 4.

*Animal* inter maxima sui generis, majus sæpe quam *L. ater*, corpore magis elongato. Color plerumque cinereus vel fusco-griseus, clypeo saturatiore, postice subangulato, striis subtilibus, curvatis, concentricis, fere ut in latere volari apicis digiti humani,  
no-

notato. Apertura lateralis aliquantum pone medium clypei. Collum supra lineis duabus approximatis longitudinaliter exaratum. Tentacula longa pallida. Dorsum teres, postice triquetrum, acuminatum, carinâ rugosâ, sive cristâ prope extremitatem notatum. — Color variat, jam immaculatus, sæpius vero maculis & punctis nigricantibus, in clypeo irregularibus, in dorso per series, fascias interruptas fingentes, positus. Subtus albidus, lateribus griseis.

*Var. α. Pallidus, clypeo ex albido & pallide fusco variegato-fasciato; corpore pallide cœruleo, fascia dorsali albida; tentaculis & collo albidis, linea utrinque fusca.*

*Var. β. Clypeo albido fasciis longitudinalibus utrinque binis fuscis; corpore cœrulescente, linea dorsali pallida, lineis nigricantibus marginata.*

*Habitat in sylvis umbrosis, in truncis & radicibus arborum putridis, haud raro.*

## 7. *Limax cinereo-niger.*

*L. cinereo-niger, immaculatus; clypeo strilis subcircularibus, postice angulato. Apertura laterali postica; carina dorsi luteo-alba, prope clypeum incipiente; corpore postice compresso-triquetro.*

Longit. 12 centim.

*Limax cinereo-niger, Sturm Faun. VI. 1. cum fig.*

*Limax ater β. Müll. Verm. hist. p. 2?*

*Va.*

*Variet. α. Griseo-niger, corpore obsolete longitudinaliter fasciato; linea dorsali albida.*

— *β. Niger linea dorsali albida interrupta.*

*Animal* quoad magnitudinem & formam cum *Lim. cinereo* probe convenit, & forte non nisi varietas ejusdem est. Longit. circa 5 unc. Clypeus lineis concentricis, postice angulatus, aperturâ laterali magnâ, pone medium. Dorsum striis & rugis interruptis, postice triquetrum, in carinam compressum. Collum supra lineis duabus longitudinalibus exaratum; ceterum lineis quasi reticulatum. Tentacula longa, pallide grisea, quasi reticulata. Color griseo-niger, lineâ dorsali luteo-alba, pone clypeum abrupte incipiente, ad extremam caudam producta. Corpus subtus medio albidum.

*Habitat* in densis & umbrosis sylvis, in truncis & foliis putridis, rarius.

## 8. *Limax agrestis.*

*L. pallide griseus, immaculatus vel nigro variegatus; clypeo striis concentricis; apertura laterali postica; tentaculis fuscis; muco lacteo.*

Longit. 25-35 millim.

*Limax agrestis*, Linn. Fn. p. 508. — Syst. Nat. p. 1082. — Müll. Verm. hist. p. 8. — Draparn. Moll. terr. & fluv. p. 126. t. 9. f. 9. — Sturm Fauna VI. 1. cum figg. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 21.

*Var.*

*Var. α. Albidus vel pallide griseus, immaculatus; collo supra & tentaculis pallide fuscis.*

— *β. Variegatus ex albido & cinereo; tentaculis fuscescentibus.*

— *γ. Pallidus, subrufescens, obsolete variegatus; tentaculis fuscis.*

— *δ Griseus, nigro maculatus & variegatus; collo supra & tentaculis fuscis.*

— *ε. Nigricans, tentaculis & linea colli utrinque nigris.*

*Obs.* In hac varietate (*ε.*) color griseus maculis nigris tam confertis variegatus est, ut nigricans tota appareat.

*Animal* inter minora sui generis, vix 2 unc. attingit. Clypeus lineis subtilibus concentricis striatus, apertura laterali postica margine sæpius albo. Collum supra lineis duabus longitudinalibus approximatis exaratis, quas inter linea elevata. De his lineis aliæ utrinque lineæ exaratae, parallelæ deorsum & antrorsum oblique excurrunt. Collum præterea læve. Tentacula reticulato-striata. Dorsum substriatum, postice compressum. — Color variat, ut jam illum descripsimus. — Tactus vel pressus obducitur muco lacteo, subspisso, uberrimo.

*Obs.* Variat admodum colore; dignoscitur tamen semper præsertim muco lacteo & lineis colli exaratis, parallelis, deorsum & antrorsum oblique cur-



currentibus. Hæ lineæ bene expressæ sunt in figura inferiore Sturmiana, jam citata.

*Habitat* in sylvis, hortis & campis, vulgaris.

Var. ♂. in hortis ad Lund, inter folia putrida, frequens.

## 9. *Limax tenellus*.

*L. luteo-virescens*, clypeo luteo; tentaculis & linea colli utrinque nigris.

Long. 25 - 30 millim.

*Limax tenellus*, Müll. Verm. hist. p. 11. n. 210. —

Draparn. Moll. terr. & fluv. p. 127.

*Animal* parvum, vix  $1\frac{1}{4}$  unc. longum. Clypeus lineis subtilibus concentricis striatus, apertura laterali postica. Collum supra linea longitudinali elevata, lateribus subreticulatis. Dorsum postice compressum. Color clypei & dorsi postici luteus; dorso supra luteo-virescente levissime cinerascens, subtus albo. Tentacula caput & linea colli utrinque nigra. Mucus luteus.

*Obs.* Quoad magnitudinem & formam *Limaci flavo* N:o 5, subsimilis, sed distincta est species ad diversam familiam pertinens.

*Habitat* in sylvis inter folia putrescentia, humida, rarius.

## II. VITRINA. Drap.

*Animal* elongatum, pallio antice producto, rugoso, collum tegente, appendicem linguæ-  
for-

formem, e dextro latere supra testam reflexam, emittente; tentaculis quattuor, inferioribus binis brevissimis.

*Testa* depressiuscula, tenuissima, imperforata; spira brevi, anfractibus paucis; apertura magna rotundato-lunata; margine columellari arcuatim exciso.

*Obs.* Zoologi plurimi, præsertim gallici, contendunt animal VITRINÆ testâ suâ totum excipi non posse; hoc vero in nostram saltem speciem minime quadrat. Hujus enim animal non solum testâ suâ totum excipitur, verum etiam, ingressum & quietum, extra se vacuum, ut ceteri *Helicini*, relinquit.

## 1. *Vitrina pellucida*.

*V. testa subdepressa, tenuissima, hyalina, nitidissima, virescente; anfractibus tribus; apertura obliqua rotundo-lunata.*

Diam. 4-5 m. m. altit. 2-3 m. m.

*Helix pellucida*, Müll. Verm. hist. p. 15. n. 215. —

Fabr. Fn. Grœn. p. 389.

*Vitrina beryllina*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 47.

t. 3. f. 1.

*Animal* griseo-rufescens, pallio saturatiore, nigricante variegato, rugoso, collum partim vel usque ad basin tentaculorum superne vestiente. Apertura lateralis superne nigro marginata. Pone aperturam e margine pallii dextro emittitur appendix oblonga, rugosa,

gosa, albida, plerumque immaculata, in testam revoluta, motu perpetuo, undulatorio, verticem petente.

*Testa* subdepressa, tenerrima, vitrea, nitidissima & pellucidissima, levissime transversim striata; animalculo foeta brunneo-viridis, junior magis flavescens; vacua pallida, virescens; anfractus 3-3½ quorum extimus maximus, ceteris parvis. Sutura leviter exarata, transversim rugoso-striata. Apertura magna, obliqua, subrotunda, segmento parvulo anfractus penultimi aliquantulum lunata. Margo lateralis longius productus, margine columellari exciso. Peristoma simplex, acutum.

*Habitat* passim in muscis & inter folia putrescentia in sylvis & hortis, a Scania meridionali usque in maxime boreales peninsulae plagas. In hortis ad *Lund* & ad vicos Scaniae campestris, per totam hyemem, tempestate leni & pluviosa, hanc cochleam, inter folia humida, eadem ac per æstatem vivacitate gaudentem, non raro offendimus.

*Obs.* Juxta finem mensis Januarii quædam specimina hujus speciei collegi, & sub vitrea campanula, in cubiculo leviter calefacto, inter folia putrescentia posui. Die 19 mens. Februarii primo observavi *ovula* hujus animalculi inter folia quotidie humectata. Colore erant alba subpellucida, puncto medio opaco, forma ovali-globosa, acervatim posita; in singulo acervo 8-9. — Ad initia mens. Martis punctum album opacum non solum magnitudine auctum verum etiam motu proprio præditum reperiebatur. Sub motu len-

to varias formas induebatur. — Dieb. 21 - 22 mens. Martis, ovula excludebantur. Hunc singularem partum per microscopium observandi mihi occasio fuit optima. Scilicet cum ad maturitatem pervenit foetus, nec diutius capi potest intra parietes ovuli angustos, ubi antea motu perpetuo indicavit studium carcere exeundi; videtur membranas ovuli corrodere, & per foramen, hoc labore ortum, primo caput deinde pedem emittere. Postea omnes nervos in eo contendit ut *testam* quoque secum ex ovulo educat. Hic labor difficilis contentione, ut videtur, magna tandem perficitur. Sic ovulo liberata & *animal* & *testa* jam perfecte formata sunt. *Animal* totum album, pellucidum, oculis nigris citissime jam in corpus retractis & rursum protrusis. *Testa* nitidissima, pellucida, hyalina, luteo-virescens.

---

## HELIIX. Drap.

*Animal* elongatum, pallio antice abbreviato, testâ condito, appendice supra testam reflexa destituto; collo nudo; tentaculis quattuor cylindraceis, superioribus binis majoribus, apice obtusis, oculiferis.

*Testa* subglobosa vel depressa, apertura integra, fere latiore quam longa, semilunari, segmento circuli per anfractum penultimum, convexum demto.

\*\* Te-



\* *Testa conico-globosa.*

1. *Helix bidentata.*

*H. testa conico-globosa, brunnea, perforata; anfractibus octonis; apertura depressa bidentata; peristomate reflexo, albo.*

Diam. 8. m. m. altit. 5-6 m. m.

*Animal:* collo supra, capite & tentaculis granulatis, griseo-nigricantibus, pede albo, flavescente: collo superius lineâ longitudinali media elevata notato.

*Testa* brunnea seu fulvo-fusca, pellucida, subtiliter striata, animalculæ fœta nigro maculata vel variegata, supra obtuse-conoidea, saturatior, subnitida, subtus convexa & magis nitida. Spiræ anfractus  $7\frac{1}{2}$ -8, ultimo obtuse angulato, zona albidâ cincto. Apertura obliqua transversa, triplo fere latior quam longa, subtus dentibus duobus obtusis albis, exteriore aliquantum majore, ornata. Peristoma reflexum, margine columellari albo, margine laterali longius producto, subincarnato. Foramen centrale minimum, margine columellari, reflexo, semitectum.

*Junior:* Testa pallidior, magis pellucida, supra magis depressa, anfractu ultimo magis angulato; peristomate simplici, acuto. — Sub microscopio tota testæ superficies alutacea, sive granulis confertis, ovalibus, transversis, per series positâ, limæ instar, ornata.

*Obs.* Multa habet hæc species communia cum *Helice edentula* & *unidentata*, Draparn. Moll. terr.  
&

& fluv. p. 80, 81. t. 7. f. 14, 15; differt vero ab utraque majori numero anfractuum & dentibus aperturæ duobus distinctis. In triginta speciminibus variæ ætatis, quæ examini subjeci, nullam aliam observavi hispiditatem, quam granula jam descripta, quibus superficies testæ, sicuti in *H. incarnata*, scabra est.

*Habitat* in nemoribus inter folia putrescentia, raro. Nondum nisi in Scania ad *Esperöd*, prædium celeberr. Professoris FALLÉN inventa.

## 2. *Helix fulva*.

*H. testa conico-globosa, fulva, imperforata, nitida; apertura depressa; peristomate simplici.*

Diam.  $2\frac{1}{2}$ ; altit. 2. m. m.

*Helix fulva*, Müll. Verm. hist. p. 36. n. 249. — Drap. Moll. p. 81. t. 7. f. 12, 13. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 23. t. 2. f. 2.

*Animal* supra pallide fuscum tentaculis longis cylindricis saturationibus; subtus album.

*Testa* subfulva seu colore succineo, pellucida, nitida, lævis, supra depresse-conoidea, subtus convexa nitidissima, centro imperforato, fossula tantum notato. Anfractus 5-6. ultimo obtuse angulato. Apertura transversa, subarcuata, duplo latior quam alta; peristomate simplici.

*Habitat* in nemoribus inter folia putrescentia & in muscis humidis, a Scania usque in boreales peninsulæ plagas, ex. gr. in subalpinis Jemtlandiæ, unde illam misit Cl. Dr *Retzius*. In Scania haud rara.

### 3. *Helix aculeata*.

*H. testa conico-globosa, umbilicata, fusca, lamellis transversis spiniferis aculeata; apertura rotunda; peristomate patulo, subreflexo.*

Diam. 2. m. m. altit. fere 2. m. m.

*Helix aculeata*, Müll. Verm. hist. p. 81. n. 279. —

Draparn. Moll. p. 82. t. 7. f. 10, 11.

*Animal* albidum, dorso & tentaculis jam griseis jam pallide cœrulescentibus. Tentacula longa, plane cylindrica. — Quando animal incedit testam ita fert ut vix nisi tentacula in adspectum veniant.

*Testa* inter minimas sui generis inquirentem facile eludit specie sua primo intuitu magis parvulum semen, quam cochleam simulanti. Junior magis fulvo-fusca, senior & major fusca interdum nigro fusca, subpellucida. Spira obtuse conoidea. Anfractus quatuor teretes, ornati lamellis seu costis transversis, in singulo anfractu extus in seriem aculeorum elevatis. Aculei longi, apice acuti, interdum curvati, basi compressi, oculo quoque nudo conspicui, sed fragiles, interdum fracti desiderantur. Sutura anfractuum profunda. Apertura rotunda, segmento parvulo sublunata. Peristoma patulum, subreflexum, præsertim versus marginem columellarem, fuscum, interius callo albo marginatum. Umbilicus distinctus, nullis tamen in eo anfractibus conspicuis.

*Habitat* inter folia putrida & humida in sylva ad *Esperöd* Scaniæ; alibi Sveciæ nondum inventa.

\*\* *Te-*

\*\* *Testa globosa.*

4. *Helix pomatia.*

*H. testa globosa, ventricosa, solida, subumbilicata, rufescente, fasciis obsoletis; peristomate simplici, subpatulo; umbilico obtecto.*

Diam. 35-40. m. m.

*Helix pomatia*, Linn. Faun. Svec. p. 528. — Syst. Nat. p. 1244. n. 677. — Gmel. Syst. VI. p. 3627. n. 47. — Müll. Verm. hist. p. 43. n. 243. — Draparn. Moll. terr. & fluv. p. 87. t. 5. f. 20. 25. — Sturm Faun. VI. 1. cum figg. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 25. t. 2. f. 9. — Svensk Zoologi I. 3. tab. 18.

*Animal* lutescenti-griseum, seu sordide lutescens, tentaculis pallidioribus, corpore supra, capite & tentaculis granulatis; pede dilatato, lineis impressis subreticulato; subtus cinereo.

*Obs.* Anatomiam animalis, figuris egregiis illustratam, dedit eximius CUVIER, in: *Memoires pour servir à l'histoire Et à l'anatomie des Mollusques. Paris* 1817. 4:to.

*Testa globosa*, interdum spira productiore ovato-globosa, solida, rufescens, subopaca, striis transversis inæqualibus. Spiræ anfractus quini, infimo ceteris multo majori, fasciis 3-5 longitudinalibus rufis, interdum obsoletissimis, picto. Apertura magna, rotundato-subovata, segmento juxta apicem laterali demto. Peristoma simplex, obtusum, subpatulum,



margine columellari reflexo, albido-rubicundum. Foramen umbilicale angustum, minus vel magis obtectum. *Operculum*, quo instante hyeme animal testam operit, sordide album, calcareum, durum & solidum, extus convexiusculum, intus subconcauum, aperturæ arcte adhærens. Intra hoc, in quadam distantia, alia duo vel plura opercula membranacea & pellucida conspiciuntur.

*Ova* rotunda, testâ opacâ, coriaceâ, albâ tecta, in terram catervatim defossa, mensibus Julii & Augusti reperiuntur.

*Habitat* in horto botanico Lundensi, copiose; in hortis Nobilium Scaniæ passim. Circa Holmiam. Extra hortos nullibi apud nos.

### 5. *Helix arbustorum*.

*H. testa globosa, subperforata, unifasciata, variegata; peristomate albo, reflexo.*

Diam. 20. m. m. altit. 17. m. m.

*Helix arbustorum*, Linn. Faun. Sv. p. 529. — Syst. Nat. p. 1245. n. 680. — Müll. Verm. hist. p. 55. n. 248. — Draparn. Hist. des Moll. p. 88. t. 5. f. 18. — Sturm Fauna VI. 1. cum fig. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 24. t. 2. f. 7, 8.

*Animal* granulatum nigrum, pede postice & subtus griseo.

*Testa* globosa, solida parum nitida, transversim irregulariter striata, striis anfractuum longitudinalibus oculo non nisi armato conspicuis, fusca vel

saturate brunnea, maculis luteis & albidis variegata. Spira anfractibus  $5\frac{1}{2}$  - 6, fasciâ longitudinali saturate fusca pictis. Apertura rotundato-lunata; peristomate reflexo, labro albo. Foramen umbilicale margine columellari fere tectum, ita ut fissura tantum obliqua supersit.

*Habitat* in hortis ad Lund Scaniae, vulgaris; in sylvis Sveciae passim. — In insula ad Helgolandiam Norvegicam cochleam quoque reperimus.

## 6. *Helix nemoralis*.

*H. testa globosa, imperforata, plerumque lutea et fasciata; apertura lunata subobliqua; peristomate marginato fusco.*

Diam. 20. 22. m. m. altit. 16 — 17. m. m.

*Helix nemoralis*, Linn. Faun. p. 530. — Syst. Nat. p. 1247. n. 691. — Müll. Verm. hist. p. 46. n. 246. — Draparn. Hist. des Moll. p. 94. t. 6 f. 3-5. — Pfeiff. Land- und Wasserschn. p. 27. t. 2. f. 10, 11. — Sturm Fauna VI. 2. cum fig.

*Animal* sordide griseum vel lutescenti griseum, capite, tentaculis & fasciis duabus colli superne nigricantibus.

*Variet. α. Lutea unicolor.*

— *β. Lutea, fascia unica angusta.*

— *γ. Lutea, fascia unica latiori.*

— *δ. Lutea, fascia latissima nigra.*

- ε. *Lutea, fasciis duabus, superiore angustiore per omnes anfractus continuata.*
- ζ. *Lutea, fasciis tribus, inferioribus duabus latissimis, superiore angustiore per omnes anfractus continuata.*
- η. *Lutea, fasciis quattuor, superioribus duabus continuatis.*
- θ. *Lutea, fasciis quinque.*
- ι. *Lutea subincarnata.*
- κ. *Incarnata unicolor.*
- λ. *Incarnata, fascia obsoleta lutescente.*
- μ. *Rufa unicolor vel fasciata.*
- ν. *Castanea, aut subfusca, unicolor vel fasciata.*

&c. &c.

*Testa* globosa, solida, subnitida, transversim subtiliter striata, interdum obsolete scrobiculata, colore & numero fasciarum multis modis varians; plerumque tamen lutea aut incarnata, fasciis vel picta vel destituta. Anfractus quinque. Apertura sublunata, margine inferiore & laterale arcuatis, margine vero columellari recto & longiore, unde apertura aliquantum obliqua. Peristoma patulum, marginatum, nigro-fuscum; labrum intus callo instructum. Ea quoque pars anfractus penultimi, quæ in apertura conspicitur, magis vel minus infusca est.

*Obs.*

*Obs.* Testa junior umbilico angusto & peristomate simplici gaudet; quæ observatio ad sequentem quoque speciem pertinet.

*Habitat* in hortis & sylvis, in foliis & truncis arborum, haud raro.

## 7. *Helix hortensis.*

*H. testa globosa, imperforata, plerumque lutea et fasciata; apertura lunata subobliqua; peristomate marginato, albo.*

Diam. 16 — 18. altit. 12. m. m.

*Helix hortensis*, Müll. Verm. hist. p. 52. n. 247. —  
Draparn. Hist. des Moll. p. 95. t. 6. f. 6. —  
Sturm Faun. VI. 2. cum fig. — Pfeiff. Land- u.  
Wasserschn. p. 29. t. 2. f. 12, 13. — Lam. Hist.  
anim. s. vert. VI. 2. p. 81.

*Var. α. Lutea unicolor.*

— *β. Lutea, fascia unica.*

— *γ. Lutea, fasciis quattuor, superioribus duabus continuatis.*

— *δ. Lutea, fasciis quinque, superioribus tribus continuatis.*

— *ε. Rosea, unicolor aut fasciata.*

— *ζ. Alba, fasciata.*

&c. &c.

*Animal* lutescens, rufescens vel pallide griseum, tentaculis plerumque saturatius griseis.

*Testa*



*Testa* globosa, solida, subnitida, transversim tenuiter striata. colore & numero fasciarum, sicut antecedens, magnopere varians, plerumque tamen lutea, vel unicolor vel fusco fasciata. Interdum tota albida vel luteo-virescens. Anfractus quinque. Apertura sub-lunata, margine inferiore & laterali arcuatis, margine vero columellari fere recto & aliquantum longiore. Peristoma marginatum, subreflexum, album; labrum intus callo candido instructum.

*Obs.* A præcedenti, cui simillima est, differt magnitudine constanter minori & labro albo.

*Habitat* in hortis, fruticetis & sylvis vulgaris.

### 8. *Helix fruticum*.

*H. testa* globosa, umbilicata; apertura lunato-rotundata: peristomate patulo, subreflexo; umbilico aperto.

Diam. 18 — 20. m. m. altit. 13. m. m.

*Helix fruticum*, Müll. Verm. hist. p. 71. n. 267. —

Draparn. Hist. des Moll. p. 83. t. 5. f. 16, 17. —

Sturm Fauna VI. 3. cum fig. — Pfeiff. Land- u.

Wasserschn. p. 23. t. 2. f. 3, 4, 5. — Lam.

Hist. anim. s. vert. VI. 2. p. 83.

*Variet. α.* Alba unicolor vel fasciata.

— *β.* Albo-rufescens unicolor vel fasciata.

— *γ.* Rufa.

*Animal:* α. pallide lutescens, tentaculis fuscescentibus. β. sordide lutescens, tentaculis & stria colli

colli superius utrinque fuscis.  $\gamma$ . Nigro-fuscum sub-  
tus pallidum.

*Obs.* Hinc patet colorem testæ & colorem animalis  
inhabitantis sibi quodammodo respondere.

*Testa* globosa, tenuis, parum pellucida, alba,  
rufescens vel rufa, interdum fascia spirali ornata,  
transversim leviter striata; præterea per microscopium  
conspiciuntur lineæ anfractuum longitudinales,  
parallelæ, exaratae. Anfractus quinque vel sex. Aper-  
tura rotunda, segmento minori lunata. Peristoma  
patulum acutum, subreflexum, præsertim versus um-  
bilicum. Umbilicus patulus, profundus, ad apicem usque  
spiræ perforatus, ita ut tres anfractus commonstret.

*Testa* ab animalculo vivo habitata:  $\alpha$ . albi-  
da, lutescens, maculis parvis nigricantibus adpersa.  
Hæ maculæ in inferiori testæ plaga minores sunt &  
variores.  $\beta$ . Pallide rufescens maculis minutis ni-  
gricantibus adpersa, fasciaque brunnea ornata.  $\gamma$ .  
Saturate rufa, maculis nigro-fuscis confertis lineaque  
juxta aperturam ornata.

*Habitat* in sylvis & fruticetis, passim. Ad Fo-  
zelsång juxta Lund haud raro.

\*\*\* *Testa globosa, subdepressa.*

## 9. *Helix strigella.*

*H. testa* globosa, subdepressa, umbilicata, te-  
nui, striata; apertura lunato-rotundata; peristo-  
mate patulo, marginato; umbilico aperto.

Diam. 14—15, m. m. altit. 9, m. m.

*He-*

*Helix strigella*, Draparn. Hist. des Moll. p. 84. t. 7.  
f. 1, 2. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 32.  
t. 2. f. 6. — Sturm Fauna VI. 3. cum fig.

*Animal* supra lutescenti-griseum, tentaculis & fascia colli superius utrinque saturationibus, pallio maculis nigris testam pellucetibus.

*Testa* depresso globosa, tenuis, minus vel magis pellucida, nitidula, striis transversis conferts, oculo vel nudo distinctis, notata. Lineæ longitudinales impressæ, quas in specie præcedenti descripsimus, in hac sunt interruptæ & parum conspicuæ. Color fusco-fulvus, seu pallide brunneus, fasciâ plerumque extus albida. Anfractus sex. Apertura rotunda, segmento minori lunata. Peristoma patulum, acutum intus callo albo munitum. Umbilicus patulus & profundus.

*Obs.* Quoad formam externam & magnitudinem ad *Helicem incarnatam* accedit; quoad texturam umbilicum & aperturam *Hel. fruticum* magis refert.

*Habitat* in sylvis & fruticetis inter folia putrida, rarius. Ad Fogelsång & Esperöd Scaniæ (ipse); ex Uplandia misit D. Marklin.

## 10. *Helix incarnata*.

*H. testa globosa, subdepressa, perforata, subcarinata; apertura lunata, subobliqua; peristomate reflexo, incarnato, marginato.*

Diam. 12 — 13. m. m. altit. 8 — 9. m. m.

*He-*

*Helix incarnata*, Müll. verm. hist. p. 63. n. 259. —  
 Draparn. Hist. des Moll. p. 100. t. 6. f. 30. —  
 Sturm Fauna VI. 3. cum fig. — Pfeiffer Land-  
 u. Wasserschn. p. 33. t. 2. f. 15. — Lam. Hist.  
 anim. s. vert. VI. 2. p. 91.

*Animal* albido-rubescens, collo supra, capite &  
 tentaculis cinereo-cærulescentibus. Corpus granula-  
 tum, lineâ dorsali colli elevatiore, granulata. Testa  
 animale foeta lutescenti incarnata, maculis & pun-  
 ctis nigris adpersa.

*Testa* depresso-globosa, pellucida, brunnea, in-  
 terdum subincarnata, tenuiter striata, parum nitens;  
 per microscopium adspecta tota superficies videtur  
 alutacea seu granulis ovalibus transversis, per series  
 positis, adpersa. Spiræ anfractus sex, infimo extus  
 subangulato, lineâ albida cincto. Sutura satis pro-  
 funda. Apertura lunata, obliqua, margine columel-  
 lari longiore quam laterali. Peristoma reflexum; la-  
 brum incarnatum, intus callo lacteo vel lutescente  
 munitum. Foramen centrale angustissimum. Inter-  
 dum, præsertim testa junior, nitore quodam sericeo,  
 sed tamen debillimo, vel potius quasi rore perfusa,  
 obversa lumini splendet.

*Habitat* in nemoribus inter folia putrescentia,  
 rarius. Adhuc tantum ad *Esperöd* Scaniæ inventa.

## 11. *Helix conspurcata*.

"*H. testa subdepressa, fusco maculata, hispi-  
 da, striata; peristomate simplici*". Drap.

*He-*



*Helix conspurcata*, Draparn. Hist. des Moll. p. 105.  
t. 7. f. 23-25. — Lam. Hist. Anim. 3. vert. VI.  
2. p. 93.

*Observ.* Suspicio ad hanc speciem pertinere cochleam, in Scania apud Esperöd inventam, quam tamen nondum nisi juniorem & imperfectam vidimus.

*Animal* pallide rufescens subtus album, tentaculis & linea colli utrinque cinereo-fuscis.

*Testa* animali foeta rufescens, maculis numerosis parvis nigris & luteis variegata, supra depresso-convexa, subtus convexa, tenuis pellucida, transversim striata, pilis longis, fulvis, nitidis, apice curvatis, hispida. Præter strias transversales, inæquales, aliæ striæ spirales minutissimæ, confertæ, per microscopium deteguntur. Spira anfractibus quinque, ultimo extus obtuse subangulato. Apertura lunata. Peristoma — — ut semper in junioribus, simplex. Umbilicus mediocris profundus.

Diam. 7. m. m. altit. 5. m. m.

*Habitat* locis umbrosis & subhumidis in sylva ad Esperöd, raro. Inventam dedit D. Landgren.

## 12. *Helix hispida*.

*H. testa subdepressa, umbilicata, hispida, pellucida, fusca vel pallida; apertura semilunari; peristomate simplici vel marginato.*

Diam. 7 — 8. m. m. altit. 4. m. m.

*He-*

*Helix hispida*, Linn. Faun. Sv. p. 528. n. 2182. —  
Syst. Nat. p. 1244. n. 675. — Müll. Verm. hist.  
p. 73. n. 263. — Draparn. Hist. des Moll. p.  
163. t. 7. f. 20 - 22. — Pfeiff. Land- u. Was-  
serschn. p. 36. t. 2. f. 20.

*Var. α. Testa fusca vel saturate brunnea, pe-  
ristomate simplici.*

— *β. Testa pallida lutescens, peristomate in-  
tus callo albo marginato.*

*Animal* jam supra nigrum subtus albidum, jam  
supra pallide griseum tentaculis & linea colli utrin-  
que superius saturatioribus. Tentacula gracilia, su-  
periora longa.

*Testa* depresso-globosa fusca vel brunnea, non-  
nunquam maculata, pellucida, tenuiter striata parum  
nitens; pilis raris brevibus hispida. Interdum plane  
evanescent pili. Spira convexa, magis vel minus de-  
pressa, anfractibus quinque vel sex, ultimo vix, ac ne  
vix quidem carinato, sed linea interdum pallidiore ob-  
soleta cincto. Apertura subdepressa, rotundato-semilu-  
naris. Peristoma simplex. Umbilicus profundus, medio-  
criter apertus. — *Var. β.* multo pallidior, interdum  
albida; peristoma subpatulum; apertura intus mu-  
nita callo albo, qui testam pellucet & extus, pone  
aperturam, fasciam transversam luteam efficit.

*Habitat* in plantis & fruticibus, in hortis fere  
ubique; ad Lund frequens.

\*\*\*\* *Testa depressa, planiuscula.*

### 15. *Helix Lapidica.*

*H. testa depressa umbilicata, carinata, maculata; apertura transversa ovali; peristomate continuo, albo, reflexo.*

Diam. 14—16. m. m. altit. 6. m. m.

*Helix Lapidica*, Linn. Faun. p. 526. n. 2174. — Syst. Nat. p. 1241. n. 656. — Müll. Verm. hist. p. 40. n. 240. — Draparn. Hist. des Moll. p. 111. t. 7. f. 35-37. — Sturm Fauna VI. 2. cum fig. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 40. t. 2. f. 26, 27.

*Carocolla lapidica*, Lamarck Hist. anim. s. vert. VI. 2. p. 99.

*Animal* griseum vel nigricans, collo granulato striisque duabus saturationibus superne picto; pede postice sordide lutescente.

*Testa* fusca, brunnea vel pallide grisea, maculis transversis fuscis vel rufis ornata, supra depressa convexiuscula subtus magis convexa, extus acute carinata, transversim striata. Oculo armato pulchre alutacea seu punctis confertis elevatis granulata. Anfractus quinque; sutura subplana. Apertura transversa, ovalis, juxta carinam subangulata. Peristoma continuum, album, acutum, patulum, inferius reflexum. Umbilicus apertus, largus.

*Habitat* locis lapidosis & rupestribus sylvarum & litorum marinorum, passim. In rupibus litoreis juxta *Kullaberg* Scaniae, frequens.

14. *Helix albella*.

"*H. testa carinata umbilicata planiuscula sub-  
tus gibba, apertura semicordata*".

"It. Oeland. p. 65.

"Acta Upsal. 1736. p. 40. n. 6.

"*Habitat in montium præruptis, rarissimum ani-  
mal*".

"*Descr.* Præcedenti multoties minor. Testa su-  
pra plana fere est, subtus valde gibba & perforata  
umbilico; acies lateralis in hac versus latus pla-  
num, contrario ac in præcedenti modo, ubi margo  
in medio anfractus; hinc dum [apertura præceden-  
tis ovata est, huic erit dimidiato cordata s. cordis  
longitudinaliter dissecti dimidium referens, nullo modo  
margine dilatata; hæc constat anfractibus tribus vel  
quattuor, præcedens vero anfractibus quinque".

Vide Linn. Faun. Svec. p. 526.

*Obs.* Hanc speciem nondum vidi, nisi forte junior  
sit & nondum adulta *Helix rotundata*, id quod  
fere suspicor. Neque tamen nego *Helicem albel-  
lam*, Drap. Moll. p. 113. t. 6. f. 25-27, *Heli-  
cem explanatam*, Müll. Verm. p. 26. distinctissi-  
mam esse speciem; sed hæc species ab *Helice  
albella* Linnæi, mihi omnino diversa videtur. At  
hoc ut multa alia dies docebit.

15. *Helix pulchella*.

*H. testa depressa, umbilicata, alba aut cinerea;  
apertura circinata; peristomate subcontinuo, albo,  
reflexo.*

Diam. 2 — 2  $\frac{1}{2}$  millim.

*He-*



*Helix pulchella*, Draparn. Hist. des Moll. p. 112. t. 7. f. 30-34. — Lam. Hist. anim. s. vert. VI. 2. p. 94. — Müll. Verm. hist. p. 30. n. 232. — Sturm Fauna VI. 3. cum fig. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 43. t. 2. f. 32.

*Helix costata*, Müll. Verm. hist. p. 31. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 43. t. 2. f. 31.

*Variet. α. Testa cinerea, costata, obscura.*

— *β. Testa alba, laevis nitida.*

*Animal* album vel lutescenti-album, oculis nigris. Tentacula superiora longiuscula, gracilia cylindrica; inferiora brevia. Testa var. *β.* animalculo foeta, alba, centro supra luteo.

*Testa* supra planiuscula subtus convexa. Anfractus quattuor. Apertura fere circularis, aliquantum dilatata. Peristoma incrassatum, reflexum. Umbilicus patulus. *Var. α.* testa sordide albida vel cinerea, subopaca, plicis sive lamellis transversis costulata. *Var. β.* testa alba pellucida, nitida, laevis, per microscopium inspecta tenuissime striata.

*Habitat* in hortis, sylvis & campis, locis subhumidis sub lapidibus, in foliis putridis, in muscis &c. haud raro. Ad Lund frequens.

## 16. *Helix rotundata.*

*H. testa depressa, late umbilicata, subcarinata, striata, supra convexiuscula maculata; peristomate simplici.*

Diam. 5 millim.

*He-*

*Helix rotundata*, Müll. Verm. hist. p. 29. n. 231. —  
 Draparn. Hist. des Moll. p. 114. t. 8. f. 4-7. —  
 Sturm Fauna VI. 3. cum fig. — Pfeiffer Land-  
 u. Wasserschn. p. 44. t. 2. f. 33, 34. — Lam.  
 Hist. anim. s. vert. VI. 2. p. 92.

*Animal* griseum, dorso, capite & tentaculis  
 nigricantibus. Oculi nigri.

*Testa* depressa, supra convexiuscula, extus an-  
 gulata seu carinata, brunnea, vel fusco-fulva, macu-  
 lis saturatius fuscis, vel grisea maculis fulvis (quæ  
 testam superius fere tessulatam reddunt), pulcherri-  
 me striata, striis superne distinctioribus, pellucida,  
 subtus convexa, subnitida, tenuiter striata. Anfra-  
 ctus 6—6 $\frac{1}{2}$ , sensim crescentibus, suturâ sat pro-  
 funda unitis. Apertura rotundato-lunata, subde-  
 pressa, ad carinam subangulata. Peristoma simplex.  
 Umbilicus patentissimus ut in illo omnes fere an-  
 fractus perspiciantur.

*Variet. β. Major, diam. 7 $\frac{1}{2}$  millim. spira multo*  
*convexiore; anfractibus paucioribus (5) sed*  
*majoribus, extimo plane ecarinato. Apertura*  
*rotundata, lunata.*

*Habitat*, in hortis & sylvis, in truncis arbo-  
 rum, in muscis & inter folia putrescentia, frequens.  
*Var. β. ex Uplandia misit D. Marklin.*

*Obs.* Testa junior pallidior magisque pellucida & ni-  
 tida, supra tota plana, pulcherrime striulata, vix  
 maculata; sutura profunda; anfractus 3—4;  
 ca-

carina ad plagam superiorem magis acuta; sub-  
tus convexissima, albida, lævis nitidissima. Aper-  
tura senicordata, ad marginem angulata.

Hanc forte cochleam dedisse ansam *Helici al-  
bellæ* Lin. Fn. p. 526, jam antea monuimus.

### 17. *Helix pygmæa*.

*H. testa depressa, umbilicata, subtilissime stri-  
ata, supra convexiuscula, immaculata; anfractibus  
quattuor teretibus; umbilico patentissimo; peristo-  
mate simplici.*

*Helix pygmæa*, Draparn. Hist. des Moll. p. 114. tab.  
8. fig. 8 — 10.

*Animal* . . . . .

*Testa* pallide brunnea vel rufescens, subpellu-  
cida, transversim subtilissime & confertissime stri-  
ulata, depressa, supra convexiuscula, subtus umbili-  
cata; anfractibus quattuor teretibus, ecarinatis, sen-  
sim crescentibus. Sutura profunde exarata. Apertu-  
ra rotundato-lunata, peristomate simplici. Umbilicus  
patentissimus, ut omnes anfractus commonstret.

*Habitat* in sylvis inter folia putrida, rarissime.  
Ad *Esperöd* Scaniæ inventa.

### 18. *Helix cellaria*.

*H. testa depressa, planiuscula, umbilicata, ni-  
tida, pellucida, fulva, subtus lactea; apertura lar-  
ga, ovato-lunata; peristomate simplici, acuto.*

Diam. 6 — 8 millim.

*He-*

*Helix cellaria*, Müll. Verm. hist. p. 28. n. 230. —  
Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 42. t. 2. f. 29,  
30. \*) — Lamarck Hist. des Anim. s. vert. VI.  
2. p. 91.

*Helix nitida*, Draparn. Hist. des Moll. p. 117. t. 8. f.  
23 — 25. \*). — Sturm Faun. VI. 3. cum figg. \*).

*Helix nitidula*, Draparn. Hist. Moll. p. 117?

— — Sturm Fauna VI. 3. tab. figg. a, b, c.

*Obs.* Hæ figuræ Sturmianæ nostram cochleam quoad  
magnitudinem, formam, colorem cet. perfecte re-  
ferunt.

*Animal* jam pallide cœrulescens, tentaculis &  
linea colli superius utrinque cœruleis, jam supra sa-  
turate cœruleum lateribus pallidis, subtus album.  
Testa animale foeta saturate fulva vel brunnea, sub-  
tus pallida.

*Testa* depressa, tenuis, pellucida, nitida, sub-  
lævis vel subtilissime striata, supra plano-convexi-  
uscula, fulva seu luteo-brunnea, subtus lactea, qui  
color interdum obsoletior est. Anfractus quinque, ul-  
timo ceteris majori; sutura sat profunde exarata.  
Apertura larga, subovato-lunata, obliqua, margine  
laterali supra columellarem valde prominente. Peri-  
stoma simplex acutum. Umbilicus profundus, patulus,

*Obs.* Junior interdum albida & hyalina; in multis  
tamen ab *H. crystallina* differt.

C

Ha-

---

\*) At hæ figuræ nostris exemplaribus duplo majores  
sunt.



*Habitat* in sylvis, locis umbrosis, in plantis, foliis putrescentibus &c. haud raro. Non solum in Scania obvenit, sed & in aliis Sveciæ provinciis, saltem usque in Uplandiam.

## 19. *Helix nitida*.

*H. testa convexo-depressa, umbilicata, nitida pellucida, tenuiter striata, fulvo-fusca, concolore; apertura mediocri sub-rotunda, lunata; peristomate simplici, acuto:*

Diam. 4-6 millim.

*Helix nitida*, Müll. Hist. Verm. p. 32. n. 234. —

Lamarck Hist. des Anim. sans vert. VI. 2. p. 97.

*Helix lucida*, Draparn. Hist. des Moll. p. 103. t. 8.

f. 11, 12.

*Animal* nigrum totum, vel griseo-nigricans, pede & corpore subtus dilutius griseis; tentaculis, capite & collo semper nigris. Tentacula longa gracilia apice incrassata. Testa animale foeta nigra in fulvo-fuscum vergens, subtus & superne concolor.

*Testa* præcedenti similis sed aliquantum minor, supra magis convexa, spirâ aliquantum productione, nitida, pellucida, tenuiter striata, saturate fulva vel fulvo-fusca supra & subtus. Anfractus  $4\frac{1}{2}$ —5, ultimo aliquantum minori & minus depresso quam præcedentis, respectu habito ad magnitudinem testæ; unde apertura minus larga & magis rotunda, seu lunato-rotunda, minusque obliqua. Peristoma simplex, acutum. Umbilicus patulus, profundus.

*Obs.*

*Obs.* Mensib. Majo & Junio ova parit. Hæc, subde-  
presse-globosa, crustâ albâ calcareâ munita, non  
catervatim sed solitaria plerumque reperiuntur.

*Habitat* in muscosis humidis, præsertim juxta  
aquas; in sylvis quoque & fruticetis inter folia pu-  
trescentia &c., passim. In muscis humidis juxta pi-  
scinam inferiorem ad villam episcopalem *Helgonbac-*  
*ken* prope *Lund*, haud raro.

## 20. *Helix crystallina*.

*H. testa depressa convexiuscula, tenuissima,*  
*hyalina, nitida, albida; apertura depresso-lunata;*  
*peristomate simplici.*

Diam. 3 millim.

*Helix crystallina*, Müll. Verm. hist. p. 23. n. 123. —

Draparn. Hist. des Moll. p. 118. t. 8. f. 20. —

Pfeiffer Land- und Wasserschn. p. 46. t. 2. f. 36.

*Animal* album, collo interdum superius cine-  
rascente, tentaculis & lineis duabus colli superne sa-  
turatoribus, nonnumquam nigris. — Cum incedit  
animal, collum sæpius, pro magnitudine, longissime  
extendit, illoque contrahendo, testam adtrahit. —  
Testa animale foeta, nitidissima, alba, superne medio  
lutea l. fulva.

*Testa* supra depressa convexiuscula, subtus  
convexa, tenuissima, albida vel virescenti-alba, hya-  
lina, nitidissima, lævis, minutissime striata. Anfra-  
ctus quinque, sensim crescentes. Apertura semiluna-  
ris,

ris, subdepressa, duplo latior quam alta. Peristoma simplex. Umbilicus angustissimus.

*Habitat* in muscis subhumidis & inter folia putrescentia, passim. In muscis ad *Fogelsång* & in sylva ad *Esperöd* inter frondes dejectas, frequens.

#### IV. BULIMUS. Lam.

*Animal* heliciforme, tentaculis superioribus apice globosis, oculiferis; inferioribus brevibus.

*Testa* ovata vel oblonga, apertura integra, longiore quam lata, marginibus inæqualibus, superne disjunctis; columella lævi, basi integra.

##### 1. *Bulimus obscurus*.

*B. testa ovato-oblonga, subventricosa, fusca, substriata; peristomate albo reflexo.*

Longit. 7-8 millim. Lat.  $3\frac{1}{2}$  m. m.

*Bulimus obscurus*, Draparn. Hist. des Moll. p. 74. t.

4. f. 23. — Pfeiffer Land- u. Wassersch. p. 52.

t. 3. f. 11.

*Helix obscura*, Müll. Verm. hist. p. 103. n. 302.

*Bulimus hordeaceus*, Lamarck, Hist. d. anim. s. vert.

VI. 2. p. 125.

*Animal* supra fuscum, subtus albidum, lateribus subcinereis, reticulatis. Tentacula cylindrica, su-  
pe-

periora longa, extremitate in globum incrassata; oculis nigris.

*Testa* ovato-oblonga aliquantum ventricosa, brunnea vel pallide fusca, pellucida, subtiliter striata, parum nitida, limbo plerumque obducta & sic obscura. Spiræ anfractus 6-7; sutura parum profunda; vertice obtusiusculo. Apertura rotundato-ovata, superne oblique excisa. Peristoma album, patulum, subreflexum, præsertim margine columellari. Fissura umbilicalis obliqua.

*Habitat* in umbrosis & humidis sylvis, inter folia putrida, raro. Ad *Esperöd* Scaniæ huc usque tantum observata, & illuc quoque raro reperta.

## 2. *Bulimus lubricus*.

*B. testa ovato-oblonga, fulvo-fusca, lævi, nitidissima; peristomate simplici.*

Long. 7. latit.  $2\frac{1}{2}$  millim.

*Variet. β. Testa minore, graciliore, fere cylindracea, anfractibus 5. — In ceteris similis.*

*Animal* supra cinereo-nigricans, subtus & lateribus pallide cinereum. Tentacula nigra, inferiora brevissima.

*Testa* ovato-oblonga, fulvo-fusca, pellucida, lævissima, nitidissima. Spiræ anfractus sex convexiusculi; vertice obtusiusculo. Apertura ovata, superne angulata. Peristoma simplex, subincrassatum intra marginem pallidum fascia plerumque purpurea. Fissura umbilicalis nulla.

*Obs.*



*Obs.* Pulli, qui sæpius pro distincta specie a tironibus sumuntur, testam habent ovatam, ventricosam, subperforatam, apertura semiovali, utrinque subangulata; peristomate acuto.

*Habitat* in muscis subhumidis, sub lapidibus, inter folia dejecta & putrida &c. vulgaris. In hortis ad *Lund* frequens.

## V. ACHATINA. Lam.

*Animal* elongatum, pede compresso, acuto; tentaculis quattuor cylindricis, retractilibus, superioribus binis majoribus, apicis globo & puncto nigro carentibus.

*Testa* oblonga, apertura integra longiore quam lata; peristomate simplici acuto; columella lævi, basi truncata.

### 1. Achatina Acicula.

*A. testa cylindraneo-conoidea, alba, lævi, nitida; anfractu infimo spiram subæquante.*

Longit. 5 millim. Lat.  $1\frac{1}{2}$  m. m.

*Achatina acicula*, Lamarck, Hist. des anim. s. vert. VI. 2. p. 133.

*Bulimus acicula*, Draparn. Hist. des Moll. p. 75. t. 4. f. 25. 26. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 51. t. 3. f. 8. 9.

*Buccinum acicula*, Müll. verm. hist. p. 150. n. 340.

*Obs.*

*Obs. Helix octona*, qualis a Linnæo in *Syst. nat.* p. 1248. n. 698. describitur, & quæ a plerisque ad hanc speciem citatur, mihi saltem videtur huc pertinere non posse. Vide cet. sub nostra *Paludina octona*.

*Animal* totum album, striato-granulatum, collo superius lineâ longitudinali media elevata. Tentacula quattuor retractilia, cylindrica, superiora majora granulosa, apice nec incrassato, nec puncto nigro (*oculo* \*) notato, sed lævi, convexo-truncato. Infra tentacula antice os fissuram verticalem fingit. Pes compressus, postice acuminatus, juxta anfractum penultimum, incedenti animale, terminatus. Apertura pro respiratione in dextro animalculi latere (in media fere testæ apertura sita) rotunda, sat magna; qua apertâ per testam pellucet vesica longitudinalis, aërea, per vices dilatata & contracta; unde cordis motus per systolen & diastolen non parum refert. At motus irregularis, jam celer jam lentus &, aperturâ respiratoriâ clausâ, mox subsistens, apertâ iterum

---

\*) Contendit quidem Celeberr. *Lamarck*, l. c. p. 127. animalia ad genus *ACHATINÆ* pertinentia, cui nostram quoque speciem adnumerat, quattuor habere tentacula, quorum superiora duo majora, apice oculifera sunt. Sed in hac specie oculi sane nulli deteguntur, nisi alba sunt, uti ipsa tentacula. Hæc enim terminantur superficie convexa, lævissima, nitidissima, annulo subimpresso cincta, quæ superficies, sine dubio, *oculo* aliorum molluscorum terrestrium respondet. At verosimile nobis videtur hoc animal, quod sub terra continuo vivit, ubi oculis uti non potest, oculis plane carere.

rum incipiens, certe non cordis sed pulmonis est motus. Quare hæc vesicæ pulmonalis contractio & dilatatio, quam in nulla alia Cochlea adhuc observavimus, (quamvis in omnibus forte, aërem respirantibus, obveniat), nobis videtur habere analogiam cum contractione & dilatatione cavitatis pectoralis sub respiratione animalium perfectiorum. — Quando animal incedit testam interdum erectam fert, plerumque vero dejectam trahit. Testa animale foeta, albidâ, vitrea, nitidissima; spira rubra vel luteo-rufa.

*Testa* gracillima, oblonga, subcylindracea, versus extremitatem tamen inferiorem sensim subcrassior vertice obtusiusculo, alba, nitida lævis, pellucida, striis tantum lenticulo oculari conspicuis, tenuissimis. Spiræ anfractus sex, planiusculi vel parum convexi, infimo dimidiam fere longitudinem totius testæ efficiente; utraque parum profunda, sub microscopio marginata videtur. Apertura oblongo ovata superius acuminata. Columella basi truncata. Peristoma simplex, acutum. Fissura umbilicalis nulla.

*Habitat*, subterraneam vitam agens, sub muscis & lapidibus in ipsa terra, plerumque prope aquas, ubi fibrillis & succo radicum graminearum, sine dubio, vescitur. — Ad *Lund* Scaniæ, rarius; alibi Sueciæ nondum reperta.

## VI. SUCCINEA. Drap.

*Animal* crassum, tentaculis breviusculis, inferioribus conoideis, obtusis, brevissimis; superioribus a basi ad medium incrassatis, apice globosis oculiferis.

*Testa* ovata, apertura ampla, integra altior quam lata, columella lævi; peristomate acuto.

### I. Succinea amphibia.

*S. testa oblongo-ovata, tenui, pellucida; spira brevi; apertura magna ovata.*

Longit. testæ 10-16; aperturæ 8-10 millim.

*Succinea amphibia*, Draparn. Hist. des Moll. p. 58. t.

3. f. 22. 23. — Pfeiff. Land- u. Wassersch. p. 67.

t. 3. f. 36-38. — Lamarck, Hist. anim. s. vert.

VI. 2. p. 135.

*Helix putris*, Lin. Faun. Sv. p. 531. — Sturm Fauna VI. 1. cum figg.

*Helix succinea*, Müll. verm. hist. p. 97. n. 296.

*Variet. α. Testa fulvo-lutea. vel pallide lutea.*

— *β. Testa luteo-rufa, subcrassiuscula, marginis striata.*

*Animal* granulosum, tentaculis a basi ad medium conico-incrassatis, granulosis, extra medium coarctatis, lævibus, apice globosis, oculiferis. Oculi nigri. *Var. α.* animal albidum, supra pallide cœruleum, collo supra utrinque & tentaculis lineâ longitu-



tudinali nigricante. *Var. β.* aterrimum, subtus in cœruleum vergens. Testa animale foeta nigro olivacea, vertice cœrulescente.

*Testa* ovata aliquantulum oblonga, tenuis pel-lucida, nitida, subtiliter & inæqualiter striata. An-fractus 3-4, ultimo maximo, oblongo, convexo, cete-ris parvis, spiram brevem formantibus. Apertura magna ovata, superne angulata, subverticalis,  $\frac{2}{3}$ , ex totius testæ longitudine æquans. Peristoma simplex, acutum. Fissura umbilicalis nulla.

*Habitat* var. *α.* in plantis, herbis, arborum truncis & foliis, ab aqua remotioribus; var. *β.* in plantis aquaticis & lapidibus &c. juxta aquas sitis. Vulgaris.

*Obs.* Hæc species transitum satis perspicuum ad *Mol-lusca aquatica* format, quibus per genus *LYMNÆE* præsertim connectitur.

## VII. CLAUSILIA. Drap.

*Animal* gracile, tentaculis inferioribus brevissimis.

*Testa* fusiformis, gracilis, vertice obtu-siusculo; apertura sinistrorsa, subovata vel pyriformi; peristomate continuo subreflexo; ossiculo lamelliformi elastico fauces imas claudente.

i. Clau-

# 1. *Clausilia bidens*.

*Cl. testa fusiformi, lævi, brunnea, nitida, pellucida; apertura ovata; columella biplicata, interstitio plicarum & peristomate lævibus.*

Longit. 16-17 millim. Lat. 4 m. m.

*Clausilia bidens*, Draparn. Hist. des Moll. p. 68. t. 4. f. 5-7. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 60. t. 3. f. 25.

*Helix bidens*, Müll. Verm. hist. p. 116. n. 315. — Sturm Fauna VI. 2. cum figg.

*Obs. Turbo bidens* Linn., qui non ut Sueca sed tantum ut Europæ meridionalis incola Linnæo fuit cognitus, quique "*sutura subcrenata*" distinguitur, potius ad sequentem speciem pertinere nobis videtur.

*Animal* supra nigricans pede nigricanti-griseo, reticulato, subtus albidum.

*Testa* fusiformis, aliquantum ventricosa, brunnea, fusco-brunnea vel lutescenti brunnea, pellucida, nitida, lævis, tenuissime striulata, striis in anfractu infimo aliquantum magis conspicuis. Spiræ anfractus 11-12, convexiusculi; vertice obtuso. Sutura parum exarata, lævis. Apertura ovata, superne levissime coarctata, plicis columellæ duabus, intus convergentibus; columellâ præterea & peristomate lævibus; in pariete opposito, in ipsis faucibus, aliæ duæ plicæ minores, seu lineæ elevatae albæ, distantissimæ sitæ sunt, quarum inferior incisuræ clausilii respondet. In imo anguli sinistri prospicitur *Clausilium*,  
(si-

(sive lamella ossea fauces, animale in testam regresso, claudens) oblongum, album, nitidum, læve, elasticum, subarcuatum, altero latere convexum altero concavum, pedicello attenuato acuminato, aliquantum spiraliter flexo & columellæ adfixo terminatum, superne obtuse rotundatum, incisurâ sublaterali rotundâ excisum. Peristoma album, incrassatum, reflexum. Fissura umbilicalis exigua.

*Habitat* in sylvis, præsertim faginis, in arborum truncis & radicibus, in muscis &c., vulgaris.

## 2. *Clausilia papillaris*.

*Cl. testa fusiformi, albida, tenuiter striata; sutura papillis albis crenulata; apertura rotundato-ovata; columella biplicata, interstitio plicarum & peristomate lævibus.*

Long. 11. m. m. Lat. 3. m. m.

*Clausilia papillaris*, Draparn. Hist. des Moll. p. 71. t.

4. f. 13. — Lamarck, Hist. des anim. s. vert. VI.

2. p. 115.

*Helix papillaris*, Müll. Hist. verm. p. 120. n. 317.

*Turbo bidens*, Lin. Syst. Nat. p. 1240, n. 649.

*Animal* . . .

*Testa* præcedenti minor, & pro longitudine aliquantulum ventricosior, ceterum forma eadem, albida vel cinerea, pellucida, tenuiter striata, striis haud confertis. Anfractus 9. convexiusculi, vertice obtuso. Sutura parum profunda, lineâ subfuscâ & tuberculis parvis albis ornata. Apertura rotundato-ovata patula; columella biplicata, interstitio plicarum &

& peristomate lævibus. Clausilium apice rotundatum, non emarginatum. Peristoma album, reflexum. Fissura umbilicalis magis profunda quam in præcedente. Eminentia dorsalis juxta fissuram magis prominens.

*Habitat* in sylvis frondosis, præsertim faginis, in truncis muscosis & putridis, rarissime. Ad *Frölinge* in Hallandia reperta 1814; alibi Sueciæ nondum visa.

### 3. *Clausilia plicatula*.

*Cl. testa fusiformi, rufo-fusca, striata; apertura rotundata, superne sinu aucta; columella quadri-quinque-plicata, plicis duabus magis perspicuis.*

Longit. 13. lat.  $2\frac{1}{2}$  millim.

*Clausilia plicatula*, Draparn. Hist. des Moll. p. 72. t.

4. f. 17. 18. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn.

p. 64. t. 3. f. 31. — Lamarck, Hist. des anim.

s. vert. VI. 2. p. 115.

*Animal* griseum, subtus albidum, capite & tentaculis nigricantibus.

*Testa* fusiformis, pro longitudine gracilior & strictior quam præcedentes, rufo-fusca vel saturate fusca, inferius alba, subpellucida, parum nitida. Anfractus 12 conveniusculi, transversim striati, striis elevatis subplicæformibus, sulcīs latioribus distinctis. Apertura, pro magnitudine testæ, minor quam in præcedente, ovato-rotundata superne coarctata, vel potius rotunda, superne ad marginem lateralem sinu angusto notata. Columella quadri- vel quinque-plicata-



cata, plicis lateralibus duabus majoribus: superiore elevata, compressa, ad marginem usque extensa: inferiore crassiore, brevior, intra marginem terminata & in pliculas duas, ad marginem productas, continuata; præterea pliculæ plerumque duæ, his conformes interstitium majorum plicarum juxta marginem ornant. Peristoma patulum, reflexum, album, magis solutum & productum quam in præcedentibus; anfractus infimus inferius subangulatus, cum axi testæ longitudinali angulum fere rectum formans.

*Variet. β. Testa brevior, crassior, subventricosa, obsolete striata; anfractibus decem; apertura major; plicis columellæ duabus distinctis, ceteris subobsoletis.*

Longit. 10-11; latit. fere 3 millim. - An distincta species? An *Clausilia biplicata* Pfeiff. l. c. p. 61.?

*Habitat* in truncis arborum putridis, in foliis putrescentibus, in muscis muros & lapides vestientibus, &c.

#### 4. *Clausilia rugosa.*

*Cl. testa fusiformi, fusca, subtiliter striata, apertura ovata superne coarctata; columella biplicata; fauce inferius tuberculo longitudinali albo coarctata.*

Long. 9. lat.  $2\frac{1}{2}$  millim.

*Clausilia rugosa*, Lamarck, Hist. des anim. s. vers. VI.

2. p. 115? - Diaparn. Hist. d. Moll. p. 73. t. 4. f. 19. 20?

*Var.*

*Var. α. Testa saturate fusca; plicarum columellæ interstitio lævi vel pliculis minutis duabus notato.*

— *β. Testa gracili, nigro-fusca.*

— *γ. Testa majori subventricosa brunnea, nitida, minutissime striata; plicarum columellæ interstitio pliculâ solitariâ obliquâ.*

*Obs. Var. γ. distinctam esse speciem, verosimile nobis videtur.*

*Animal* griseum, collo supra, tentaculis & capite nigris.

*Testa* fusiformis brunnea vel saturate fusca, subtiliter & pulchre striata. Anfractus decem. Apertura ovata, superius coarctata. Columella biplicata interstitio plicarum jam lævi, jam obsoletius bi-triplicato. Inferius & profunde in aperturâ tuber album longitudinale (strias anfractus perpendiculariter secans) prominet; ad latus ejus dextrum sive columellare, pone plicam columellæ inferiorem aliud tuberculum plicæforme, & ad latus oppositum, in imis faucibus, linea elevata perspiciuntur. Peristoma album, solutum, reflexum. Fissura umbilicalis sat perspicua. Eminentia dorsalis & impressio ei parallela distinctissimæ.

*Habitat var. α. & β. in Scania vulgaris. var. γ. in insula Norvegiæ Svinvår 1816 inventa, nec postea reperta.*

*Obs.*

*Observ.* In descriptione *Helicis perversæ* Cel. Müllerus (in verm. hist. p. 119.) plures species confudisse nobis videtur, scil. nostram *Cl. plicatulam*, *Cl. rugosam*, & *Pupam fragilem*.

---

## VIII. PUPA. Lam. & Drap.

*Animal*: tentaculis superioribus apice oculiferis; inferioribus brevissimis, interdum obsoletis.

*Testa* cylindracea; interdum in formam conicam vel ovatam tendens, anfractu ultimo vix majori penultimo; apertura semi-rotunda, inferne rotundata, superne truncata, marginibus subæqualibus, superius disiunctis; lamina columellari sæpissime dentata, penitus affixa, intra eos interposita.

\* *Tentaculis inferioribus brevissimis.* PUPA, Pfeiff.

### I. Pupa fragilis.

*P. testa sinistrorsa elongata, attenuato-conica, pellucida, striata, luteo-fuscescente; columella subunidentata.*

Long. 8-9; lat. 2. millim.

*Pupa fragilis*, Draparn. Hist. des Moll. p. 68. t. 4. f. 4. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 56. t. 3. f. 16. — Lam. Hist. des anim. s. vert. VI. 2. p. 110.

*Tur-*

*Turbo perversus*, Lin. Faun. Svec. p. 525. n. 2172. —  
Syst. Nat. p. 1240. n. 650.

*Animal* - - -

*Testa* attenuata, elongata, conoidea, fusco-flavescens, pellucida. Spira anfractibus 9-10 sensim crescentibus, transversim striatis, striis elevatis, vertice obtusiusculo. Apertura rotundata, superne angulata; columella dente albo, obtuso, fere in medio, (margini tamen laterali propiore) plerumque notata. Peristoma album, patulum, margine columellari subreflexo. Fissura umbilicalis perspicua.

*Habitat* in muscis truncos, muros vel rupes vestientibus, passim.

## 2. Pupa Muscorum.

*P. testa dextrorsa, cylindracea, obtusa, brunnea, sublævi; columella subunidentata; peristomate albo, reflexo.*

Long. 3 — 4; lat.  $1\frac{3}{4}$  — 2 millim.

*Pupa Muscorum*, Lamarck Hist. des anim. s. vert. VI. 2. p. 111.

*Turbo Muscorum*, Linn. Fn. Sv. p. 525. — Syst. Nat. p. 1240. n. 651.

*Helix Muscorum*, Müll. Verm. hist. p. 105. n. 304.

*Pupa marginata*, Draparn. Hist. des Moll. p. 61. tab. 3. f. 36 — 38.

*Var. α. Testa longiore; anfractibus 7 — 8; apertura edentula vel unidentata.*

D

Pu-



*Pupa Muscorum* & *Pupa unidentata*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 57 & 58. t. 3. f. 17 — 20.

*Var. β. Testa brevior, ovato-cylindrica; anfractibus 6; apertura edentula vel unidentata.*

*Pupa marginata*, Pfeiff. l. c. p. 59. t. 1. f. 23 — 24.

*Animal* pallide griseum, collo supra, capite & tentaculis nigricantibus. Tentacula inferiora brevissima.

*Testa* quoad magnitudinem & præsertim quoad longitudinem variat. Est vero semper cylindræa, vertice obtuso, pallide brunnea vel fusca, subpellucida, lævis, striulis obliquis lente oculari tantum perspicuis, subobscura vel parum nitida. Spiræ anfractus 6 — 7, raro 8, convexi, quorum superiores tres ceteris minores & in apicem obtusum decrescentes. Sutura sat profunda. Apertura semirotunda, parte superiore per anfractum penultimum excisa. Columella interdum denticulo parvo, obtuso, notata. Peristoma reflexum, album. Pone marginem aperturæ extus in quadam distantia callo albo, margini subparallelo; unde anfractus ultimus inferius subangulatus. Fissura umbilicalis distincta.

*Testa pulli* trium vel quattuor anfractuum, conica, subumbilicata, anfractu infimo extus angulato, subtus planiusculo; apertura subquadrata; peristomate simplici acuto.

*Habitat* in muscis & ruderatis, sub lapidibus sæpium &c. per totam Scandinaviam, a Scania usque  
in

in regiones alpinas Norrlandiæ & Lapponiæ. Ad Lund  
haud rara.

\*\* *Tentaculis inferioribus obsoletis aut nullis.* VERTI-  
GO, Müll. & Pfeiff.

### 3. Pupa costulata.

*P. testa dextrorsa, cylindrica, obtusa, subci-  
nerea, costulis striata; apertura unidentata, dila-  
tata; peristomate patulo.*

Long. 2 millim. latit. vix 1 millim.

An *Pupa Dolium*, Draparn. Hist. des Moll. p. 62. t.

3. f. 41, 42?

*Obs.* figg. 43, 44. ejusdem tabulæ formam testæ no-  
stræ melius referunt. At nostra differt magni-  
tudine multo minori, anfractibus paucioribus &c.

*Animal* albidum, subcinerascens, pellucidum,  
oculis nigris. Tentacula tantum duo; inferiorum ne  
minimo quidem vestigio conspicuo.

*Testa* albida vel cinerea, plane cylindrica, ob-  
tusa, subpellucida, obscura, striis elevatis pulchrè  
costulata. Spira dextrorsa, anfractibus  $6\frac{1}{2}$  — 7 con-  
vexis, subæqualibus, præter infimum, qui præsertim  
juxta aperturam, aliquantum major est. Sutura satis  
profunda. Fissura umbilicalis perspicua. Apertura  
fere rotunda, dilatata: columella dente parvulo pli-  
cæformi notata. Dens vel callus transversus intra la-  
bium columellare in ipsis faucibus perspicitur.

*Habitat* in sylvis inter folia putrida, humida,  
rarissime. Ad *Esperöd* Scaniæ repertam dedit D.  
Landgren.

#### 4. Pupa anti-vertigo.

*P. testa dextrorsa, fusca, ovata, ventricosa; apertura septemplicata; labio laterali medio coarctato.*

Long. 2. Lat.  $1\frac{1}{4}$  millim.

*Pupa anti-vertigo*, Draparn. Hist. des Moll. p. 60. t.

3. f. 32, 33. (fig. eximiæ).

An *Vertigo sexdentata*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 71. t. 3. f. 43, 44?

*Obs.* In nullo specimine dentes sex invenimus. Omnia quæ examini subjecimus, quæ multa fuerunt, aperturam illo modo munitam habebant, quo illam infra describemus.

*Animal* griseum, collo supra & tentaculis nigris.

*Testa* parva, ovata, subventricosa, obtusa, fusca vel nigro-fusca, subobscura, vix pellucida, lævis. Anfractus quinque, quorum ultimus penultimo vix major, dorso pone aperturam subangulato, transversim striato, ad marginem lateralem lineâ longitudinali impressa subcoarctato. Apertura fere semirounda, margine laterali in medio retuso, munita intus septem dentibus plicæformibus, quorum tres superne in columella, duo intra marginem lateralem, & duo intra marginem columellarem siti sunt. Peristoma album, subreflexum.

*Habitat* in muscis humidis & inter folia putrida, passim. Ad villam episcopalem *Helgonbacken*  
pro-

prope *Lund* juxta piscinam inferiorem in muscis  
haud raro. — E *Jemtlandia* misit Dr. *A. Retzius*.

## 5. *Pupa pygmæa*.

*P. testa dextrorsa, fusca, ovata; apertura  
quadridentata; labio laterali subcoarctato.*

*Pupa pygmæa*, Draparn. Moll. p. 60. t. 3. f. 30, 31.  
An *vertigo pygmæa*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn.  
p. 72. t. 3. f. 47, 48.

*Animal* griseum collo supra & tentaculis ni-  
gris.

*Testa* præcedente minor & plerumque, pro  
longitudine, gracilior, ovata, obtusa, fusca vel nigro-  
fusca, subobscura, lævis. Anfractus quinque. Aper-  
tura fere semiotunda, margine laterali vix retuso,  
intus munita dentibus quattuor, quorum unus acu-  
tus superne in columella, duo inferne infra margi-  
nem lateralem & unus intra marginem columella-  
rem siti sunt. Fauces inter hos dentes formam cru-  
cis præbent. Peristoma albidum, subpatulum.

*Habitat* in muscis humidis, in truncis arborum  
putridis &c., Scaniæ rarius. E *Jemtlandia* misit  
Dr. *A. Retzius*; e *Smolandia* *D. Boheman*.

## 6. *Pupa vertigo*.

*P. testa fulva, sinistrorsa, cylindraceo-ovata,  
obtusa; apertura 6—7-plicata, labio laterali me-  
dio coarctata.*

Long. 2. lat. 1 millim.

*Pupa*



*Pupa Vertigo*, Draparn. Hist. des Moll. p. 61. t. 3.  
f. 34, 35. (Fig. egregiæ).

*Vertigo pusilla*, Müll. Verm. hist. p. 124. n. 320.  
Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 72.

*Var. α. Testa longiore, cylindraceo-ovata, anfractibus* 5  $\frac{1}{2}$ .

— — *β. Testa brevior, ovata anfractibus* 5.

*Animal* album, collo supra & tentaculis cinereis.

*Testa* parva ovata vel cylindraceo-ovata, utrinque obtusa, fulva vel fulvo-fusca, diaphana, nitida, tenuissime striata. Spira sinistrorsa, anfractibus quinque teretibus; sutura sat profunda. Apertura fere semirotonda, labio laterali in medio aliquantum coarctato, munita dentibus sex-septem, compressis, albis, quorum duo in columella, duo infra marginem lateralem & duo vel tres intra marginem columellarem siti sunt. Peristoma subpatulum. Fissura umbilicalis perspicua.

*Habitat* in muscis humidis & inter folia putrida, passim.

## IX. AURICULA, Lam. et Drap.

*Animal* tentaculis duobus obtusis, ad basin postice oculiferis.

*Testa*

*Testa* ovato-oblonga, apertura longiore quam lata, dentata, vel plicata.

# 1. *Auricula minima.*

*A. testa* ovato-oblonga, apice obtusiuscula, alba lævis; apertura tridentata; peristomate reflexo.

Long. 2; Lat. fere 1 millim.

*Auricula minima*, Lam. Hist. des anim. s. vert. VI.

2. p. 140. — Draparn. Moll. p. 57. t. 3. f. 18, 19.

*Carychium minimum*, Müll. Verm. hist. p. 125. n.

321. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 69. t.

1. f. 5, 6.

*Animal* album, oculis nigris.

*Testa* ovato-oblonga, vertice spiræ obtuso, alba, pellucida, nitida, lævis, per microscopium observata tenuissime striulata. Anfractus 5 — 5  $\frac{1}{2}$ , quorum infimus maximus, ceteris sensim decreascentibus. Apertura ovata, labio laterali in medio subretuso, munita dentibus tribus, quorum angustissimus *acutus* in columella, *obtusus* alter in labio columellari, alter in laterali situs est. Peristoma incrassatum, reflexum.

*Habitat* in muscis & inter folia putrida haud raro.

---

## X. *Physa*, Drap.

*Animal* velo, os tegente, bilobo; tentaculis duobus longis setaceis, basi compres-

so antice oculiferis; pede longo, anguste lanceolato, postice acuminato; pallio interdum supra testam reflexo, margine digitato.

*Testa* ovalis, vel oblonga, tenuissima, imperforata plerumque sinistrorsa; spira prominente; apertura longiore quam lata, superne angustata; columella tortuosa; peristomate tenuissimo, acuto, subfornicato; operculo nullo.

### 1. *Physa fontinalis*.

*Ph. testa sinistrorsa, ovali, diaphana, nitida, pallide fulva; spira brevissima, obtusa.*

Long. 8 — 13; Lat. 5 — 8 millim.

*Physa fontinalis*, Draparn. Hist. des Moll. p. 54. t. 3. f. 8, 9. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 94. t. 4. f. 28. — Lamarck Hist. des Anim. s. vert. VI. 2. p. 156.

*Bulla fontinalis*, Lin. Faun. Sv. p. 523. — Syst. nat. p. 1185: n. 386.

*Planorbis Bulla*, Müll. Verm. hist. p. 167. n. 353.

*Animal* pallide lutescens, capite & collo supra fuscescentibus. Testa animale foeta nitida ex fuscescente & luteo variegata; pallii margine supra testam reflexo, digitato.

*Testa* ovalis, tenuissima & fragilissima, diaphana, laevis, interdum substriata nitida, pallide fulva vel lutescens. Spira brevissima, anfractibus quattuor, infimo maximo, ventricoso, ob-ovato, ceteris parvis,  
ver-

vertice obtusiusculo. Apertura sinistrorsa, elongata, ex tribus testæ partibus duas æquans, inferius rotundata, superne angustata & acuminata. Fissura umbilicalis nulla.

*Habitat* in omnibus & fossis, in plantis aquaticis præsertim in Lemna, vulgaris.

## 2. *Physa Hypnorum*.

*Ph. testa sinistrorsa ovato-oblonga, diaphana, nitida, fusco-fulva; spira exserta, acuta, sub-nigra.*

Long. 10; Lat.  $4\frac{1}{2}$  millim.

*Physa hypnorum*, Draparn. Hist. des Moll. p. 55. t. 3.

f. 12, 13. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 97.

t. 1. f. 12. & t. 4. f. 29. — Lam. Hist. anim.

s. vert. VI. 2. p. 157.

*Bulla hypnorum*, Linn. Faun. Sv. p. 522. — Syst.

nat. p. 1185.

*Planorbis turritus*, Müll. Verm. hist. p. 169. n. 354.

*Animal* nigrum tentaculis pallide griseis; palio testæ condito.

*Testa* ovato-oblonga, tenuissima & fragilissima, diaphana, fuscescenti-fulva, s. rufescens. Spira exserta, conica, acuminata, afractibus sex, infimo ceteris majori. Apertura sinistrorsa, spirâ vix longior, elongata, inferius rotundata, superne angustata & acuminata. Fissura umbilicalis nulla.

*Habitat* in fossis & rivis, in plantis aquaticis, passim.



## XI. AMPHIPEPLEA.

*Animal* crassum, breve, velo, os tegente, antice subrotundato; tentaculis duobus brevibus, triangularibus, compressis, basi antice oculiferis; pede ovato-oblongo, postice rotundato; pallio largissimo, testam involvente.

*Testa* subglobosa, tenuissima, imperforata; spira subplana vix prominula; apertura magna ovata; columella tortuosa; peristomate tenuissimo, acuto; operculo nullo.

### 1. *Amphipeplea glutinosa*.

*A. testa* obovato-globosa, diaphana, nitidissima, pallide lutescente, subplicato-striata; spira subplana anfractibus tribus; apertura ampla ovata.

Longit. testæ 10. Lat. 8; Long. aperturæ 9.  
lat. 7 millim.

*Obs.* Interdum major, usque ad 14 millim. longitud. attingens.

*Buccinum glutinosum*, Müll. Verm. hist. p. 129.

*Limnæus glutinosus*, Draparn. Hist. des Moll. p. 50.

*Animal* viscosum, breve, crassum, capite ejusque partibus præsertim incrassatis, supra saturate olivaceum, punctis luteis adpersum, subtus pallidum. Pallium crassum, supra testæ convexitatem undique reflexum, eam penitus involvit. Hoc statu cochlea glo-

globulum viscidum plane refert. Interdum, præsertim dum aquâ extrahitur, pallium undique demittit discumque testæ nudum, nitidum & politissimum monstrat. Retractum pallium marginem crassum jam integrum jam lobatum præbet. Testa animale foeta ex fusco & lutescenti variegata; qui color pallio testæ condito debetur. Pallii vero margines testam extus vestientes semper immaculati.

*Obs.* Cel. Müller l. c. animal bene descripsit; Draparnaud vero pallium, testam involvens, pro tegumine viscoso sumsisse videtur.

*Testa* obovato-subglobosa, tenerrima, fragilissima, pallio animalis polita, nitidissima, pallida, lutescens vel fulva, intus & extus inæqualiter striata, interdum subplicato-striata. Anfractus tres, quorum ultimus ampullaceus totam fere testæ longitudinem efficit; spira enim obtusissima tam brevis est (suturæque spirali fere tantum notata) ut supra marginem superiorem hujus anfractus vix emineat. Apertura ampla ovata, sub margine laterali anfractu penultimo aliquantum excisa. Peristoma simplex, acutum. Fissura umbilicalis plane nulla.

*Habitat* in lacubus & amnibus lente fluentibus, rarius. In lacu parvulo juxta fodinam lithanthracis ad *Bosarp* Scaniæ: in fluvio ad *St. Köpinge* & in amne *Höjeå* ad Lund reperta.

## XII. LYMNAEA. Lam.

*Animal* crassiusculum, velo os tegente bilobo, tentaculis duobus breviusculis, compressis, triangularibus, basi antice oculiferis; pede ovato oblongo, postice rotundato; pallio testâ plane condito.

*Testa* oblonga, interdum turrita; spira exserta acuta; apertura longior quam lata; columella plica longitudinali oblique adscendente; peristomate acuto; operculo nullo.

\* *Testa* subovata, anfractu infimo ventricoso. *Apertura* plerisque longior quam dimidia pars testæ.

### 1. *Lymnæa stagnalis*.

*L. testa* ovato-oblonga, acuta, imperforata; anfractu infimo ventricoso, superius obtuso, subangulato; spira exserta conico-subulata; apertura magna ovata.

Long. 50. Lat. 25. millim. Long. aperturæ 27.

Spiræ 25. m. m.

*Lymnæa stagnalis*, Lam. Hist. des anim. s. vert. VI.

2. p. 159.

*Helix stagnalis*, Linn. Faun. Sv. p. 530. — Syst. Nat.

p. 1294. n. 703.

*Buccinum stagnale*, Müll. Verm. hist. p. 132. n. 327.

— Sturm Fauna VI. 1. cum figg. — Schröter

Flussconch. t. 7. f. 1, 2.

Li-

*Linneus stagnalis*, Draparn. Hist. des Moll. p. 51. t. 2. f. 38, 39. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 86. t. 4. f. 19. Id. t. 1. f. 11.

— — *β. Junior*: Testa minor, imperforata, ovato-subulata, tenera, pellucida, albida vel lutescens; apertura ovato-oblonga.

*Helix fragilis*, Linn. Faun. Sv. p. 530.

*Animal* fusco-griseum, punctis albidis quasi arena adpersum. Testa animale foeta nigricans anfractu ultimo fuscescente. In *β.* animal albidum; testa animalculo foeta pallida, luteo vel fusco variegata; spira apice nigro.

*Anatomiam* animalis, figuris egregiis illustratam, vide in: *Memoires pour servir à l'hist. Et à l'anat. des Moll. par CUVIER. Paris 1817. 4.to.*

Testa ovato-oblonga, tenui, pellucida, griseo-rufescens, substriata, striis anfractus ultimi transversis subflexuosis. Anfractus  $7 - 7\frac{1}{2}$ , quorum ultimus maximus, ventricosus, praesertim superius, quâ spiram spectat, unde non sensim sed abrupte in suturam descendit; penultimus multo minor, convexus; ceteri sensim minores planulati, spiram subulatam formant. Apertura magna, ovata vel oblongo-ovata, superne subobtusata, labro repando, acuto. Fissura umbilicalis nulla.

*Habitat* in fossis, stagnis, paludibus &c. frequens.

## 2. *Lymnæa auricularia*.

*L. testa* subrotundo-ovata, perforata; spira brevissima acuminata; apertura amplissima, semi-



*micirculari, peristomate patulo; columella juxta plicam compressam excisa.*

Long. 25. Lat. 22. Long. apert. 21. Lat. 13. millim.

*Lymnaea auricularia*, Lam. Hist. nat. des anim. s. vert. VI. 2. p. 161.

*Lymnaeus auricularius*, Drap. Hist. des Moll. p. 49. t. 2. f. 28, 29. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 85. t. 4. f. 17, 18.

*Helix auricularia*, Linn. Faun. Sv. p. 532.

*Buccinum auricula*, Müll. Hist. Verm. p. 126. n. 328.  
— Sturm Fauna VI. cum figg. egregiis.

*Animal* fusco-griseum punctis albidis adpersum. Testa animale foeta jam fusca maculis fulvis variegata, jam nigricans unicolor.

*Testa* subrotundo-ovata, pallida, griseo-fulva, tenuis pellucida, subtiliter striata. Anfractus quatuor, quorum ultimus ampullaceus, superne obtusus, inferne ampliatus, maximam testæ partem efficit; ceteri, qui spiram brevissimam formant, minuti, parum convexi & in mucronem acutum desinentes. Apertura maxima, fere semicircularis, superius & inferius rotundata. Peristoma patulum, subreflexum, acutum. Columella supra plicam incisurâ obliqâ, plus minus profundâ notata; unde plica columellaris compressa & exserta. Fissura umbilicalis margine columellari reflexo semitecta.

*Habitat* in fluviis, stagnis & lacubus vulgaris.

### 3. *Lymnæa ovata*.

*L. testa ovata, perforata, tenui, subpellucida spira brevi, acuta, anfractibus 4—5, infimo ampullaceo-ovato; apertura ovata, peristomate simplici; columella tereti, plica obsoleta.*

Long. 10—25; Lat. 6—12 millim.

*Variet. α. Testa oblongo-ovata vel ovali, pallida lutescente, spira productione anfractibus subquinis; apertura oblongo-ovata.*

*Limnæus ovatus*, Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 89. t. 4. f. 21. (figura quoad formam optima). — Drap. Hist. des Moll. p. 50. t. 2. f. 30, 31, 32. (At incisura columellæ in fig. 30. naturæ haud consentanea).

— — *β. Testa ovata ampullacea, fulva, tenuissima, tenuiter striata; spira brevior; anfractibus 4—4½; apertura ovata.*

*Limnæus vulgaris*, Pfeiff. l. c. f. 22. (At nostra plerumque major anfractu infimo superne sæpius obtusior, incisura columellæ nulla). — Schröter Flussconch. t. 6. f. 6. (At spira magis quam in nostrâ exserta).

— — *γ. Testa ovata solidula, rufo-nigra, rudius striata; anfractibus quattuor.*

*Animal in α & β. lutescenti-griseum, punctis luteis quasi arena adpersum. Testa animale foeta ex fusco-viridi & fulvo variegata.*

*Testa*

*Testa* ovata, anfractu infimo ampullaceo, magis vel minus ventricoso & brevi; spira acuta jam brevior anfractibus  $4 - 4\frac{1}{2}$ , jam productiore anfractibus 5, tenuis, pellucida, plerumque subtiliter striata, interdum extus & intus subplicato-striata, fulva, jam pallida jam rufescens. Apertura magna, ovata vel oblongo-ovata, superne subangulata, longitudine ejus  $\frac{2}{3} - \frac{3}{4}$  ex longitudine totius testæ æquante. Peristoma simplex acutum, margine tantum columellari reflexo. Fissura umbilicalis plerumque aperta. Columellæ incisura nulla, plica teres, obsoleta.

*Monstrositates* vario modo deformes haud raro obveniunt:  $\alpha$ . testa longitudinaliter angulata;  $\beta$ . spira subintrusa.  $\gamma$ . spira nimis exserta.  $\delta$ . peristomate acuto & ampliato.  $\epsilon$ . peristomate amplissimo revoluta &c.

*Observ.* A præcedenti specie, ad quam interdum quoad formam proxime accedit, semper dignoscitur: columella subtereti, incisura nulla notata, plica haud exserta: anfractu infimo subovato, nec tam superne obtuso aut inferne ampliato; peristomate simplici acuto, nec patulo nisi in statu monstroso.

*Habitat*  $\alpha$  &  $\beta$ . in fluviis, lacubus & stagnis vulgaris;  $\gamma$ . in lacu quodam Ostrogothiæ quondam reperta.

#### 4. *Lymnæa balthica.*

*L. testa* ovata, subperforata, rugoso-striata, brunneo-virescente, sub-erosa; spira brevi acutiuscula,

*secula, anfractibus quattuor; apertura ovata, subampliata; columellæ plica distincta.*

Longit. 12; Lat. 7; apert 10, spir. 4.  
millim.

*Helix balthica*, Linn. Fn. Sv. p. 532. Itin. — Gothl. 261.  
— Syst. Nat. p. 1250. n. 710. — Gmel. Syst.  
VI. p. 3663.

*Animal* olivaceum, supra saturatius, tentaculis & pedis marginibus pallidis. Testa animale foeta saturate olivacea, aut unicolor aut ex olivaceo & atroviridi variegata.

*Testa* ovata, tenuis, pellucida, subobscura, epidermide griseo- vel fusco-virescenti, plerumque erosa, striis inæqualibus subrugæformibus, extus & intus notata. Anfractus quattuor, infimo maximo, ventricosus, inferius subampliatus; ceteris parvis convexis spiram brevem acutiusculam constituentibus. Apertura magna ovata, peristomate subpatulo, acuto; margine columellari reflexo fissuram umbilicalem fere obducente. Columellæ plica magis quam in præcedente specie conspicua.

*Habitat* in aqua parum salsa maris balthici, ad litora Gothlandiæ (Linn.) & Scaniciæ &c. In mari juxta *Esperöd*, fucis & lapidibus adhærens, frequenter obvenit simul cum *Paludina balthica* & *Neritina fluviatili*.



5. *Lymnæa succinea*.

*L. testa ovata, subperforata, laevis, fulvo-lutea, nitidissima; spira brevi obtusiuscula, anfractibus quattuor; apertura ovata.*

Long. 9. Lat.  $5\frac{1}{2}$ ; apert. 7. spira 3 millim.

*Animal* fusco-griseum, vel saturate olivaceum, punctis albidis instar arenæ subtilissimæ adpersum, tentaculis & corpore subtus pallidis. — Testa animale foeta saturate vel fusco-virescens, luteo marginata & variegata.

*Testa* parva, ovata, tenuis, (minus tamen fragilis quam *L. ovata* ejusdem magnitudinis), laevis, diaphana, nitidissima, pallide fulvo-lutea, sive colore succini, peristomate & sutura plerumque albidis. Spira brevis obtusiuscula. Anfractus quattuor, ultimo maximo, subampullaceo, ovato. Apertura ovata, peristomate simplici, haud patulo. Fissura umbilicalis fere obducta.

*Obs.* Quoad magnitudinem, colorem, nitorem, pelluciditatem, & quodammodo formam, *Physam fontinalem* primo obtutu non male refert. Nostra tamen ventricosior, dextrorsa, spira minus obtusa.

*Habitat* ad litora maris juxta Trelleborg, ubi simul cum *Neritina fluviatili* frequens obvenit. Inver-tam dedit Cl. Cand. Phil. År. Bruzelius.

6. *Lymnæa peregra*.

*L. testa ovato-oblonga, perforata pellucida tenuiter striata; spira medioeri, acuta; anfractibus*  
sub-

subquinis, tereti-convexis; sutura profunda; apertura ovata.

*Var. α. Testa major, subumbilicata; apertura exacte ovata, superne vix angulata; columella tereti, plica obsoletissima.*

Long. 20. Apert. 12; Spir. 9. millim.

*Linneus pereger*, Draparn. Hist. des Moll. p. 50. t. 2. f. 34, 35. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 90. t. 4. f. 23. — Schröter Flussconch. t. 6. f. 7. *Lymnaea peregra*, Lam. Hist. des anim. s. vert. VI. 2. p. 161.

*Var. β. Testa minor, subimperfata, pallida, tenuissima, subtiliter striata; spira acuta fusca, anfractibus 4; columellæ plica compressa; apertura ovata, superne angulata.*

Long. 10; apert.  $6\frac{1}{2}$ ; spir. 4 millim.

*Animal* pallide griseum punctis albidis adpersum; Testa animale foeta variegata ex fusco & fulvo; spira fusca unicolore.

*Var. γ. Testa minor subperforata, fuscovirescens, tenuis, pellucida, nitida, striata; spira minus acuta, anfractibus quattuor; apertura ovata, superne angulata.*

Long. 12. apert. 8; spir. 5 millim.

An *Linnaeus pereger*, var. Pfeiff. l. c. p. 91. t. 4. f. 24?

An

An *Lymnaea intermedia*, Lam. Hist. d. anim. s. vert.  
VI. 2. p. 162 ?

*Animal* supra nigricans, punctis albidis adpersum, marginibus pedis & tentaculis pallide griseis. Testa animale foeta nigra, in aqua aëneo subnitens.

*Obs.* Var.  $\beta$ , ni fallimur, junior est *L. peregra* & var.  $\gamma$ . forte distincta species, quæ differt a var.  $\beta$ . colore, habitu, nitore, spira crassiore & minus acuta. A *Lymn. succinea* differt colore, spira multo exsertiore, anfractibus magis convexis, infimo magis oblongo minusque ventricosos.

*Var.  $\delta$ .* Testa minor perforata, anfractibus quattuor, ultimo ventricosos; apertura rotundato-ovata, peristomate patulo submarginato.

Draparn. l. c. t. 2. f. 37.

*Testa* var.  $\alpha$ . ovato-oblonga, tenuis, pellucida inæqualiter striata, grisea lutescens. Anfractus  $4\frac{1}{2}$  - 5 tereti-convexis, infimo maximo, ovato, subventricosos, ceteris minoribus spiram mediocrem acutam formantibus. Sutura profunde exarata. Apertura exacte ovata, superne vix angulata, aliquantum longior quam dimidia pars totius testæ. Peristoma simplex acutum. Columella teres plica obliqua obsoletissima. Fissura umbilicalis aperta, verum umbilicum non raro monstrans.

*Habitat* var  $\alpha$  &  $\beta$ . in fluviis & paludibus circa Lund, passim; var.  $\gamma$ . in lacubus Sveciæ superioris, & in rivulo, orto e scaturigine in lapisdina *Bussagrafsven* ad Hör Scaniæ, frequens.

\*\* *Te*

\*\* *Testa subconica vel turrita, anfractibus æquabiliter crescentibus. Apertura plerumque brevior quam spira.*

## 7. *Lymnæa palustris.*

*L. testa ovato-oblonga, imperforata, solida, nitida, fusco-cinerea, fasciis albidis & purpureis picta; spira conico-acuta, anfractibus 7. convexiusculis; apertura oblongo-ovata.*

Long. 26; apert. 12; spir. 15 millim.

*Limnæus palustris*, Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 88. t. 4. f. 20. — Draparn. Hist. des Moll. p. 52. t. 2. f. 40—42, & t. 3. f. 1, 2. (At cum sequente specie confusa).

*Animal* . . .

*Testa* ovato-elongata, solida, nitida, fusco-cinerea, fasciis anfractuum longitudinalibus raris albis, juxta quas, aperturam versus, plerumque fascia purpurea. Spira exserta conico-acuta, anfractibus septem convexis, transversim subtiliter striatis, ultimo rugis obsoletioribus spiralibus ramosis vel subreticulatis notato. Apertura oblongo-ovata, labio intus fascia purpurea picto. Columella plicâ compressâ & exsertâ.

*Habitat* in paludibus & stagnis Smolandicæ; in Scania nondum reperta. — Communicavit amic. D. Boheman.



8. *Lymnæa fusca*.

*L. testa ovato-oblonga, solida, obscura, fusco-grisea vel nigricante; spira conico-acuta, anfractibus subsænis; apertura ovata.*

Long. 21; apert. 10; spir. 12.

*Limnæus fuscus*, Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 92.  
t. 4. f. 25.

*Buccinum palustre*, Müll. Verm. hist. p. 131.

*Limnæus palustris*, β. Draparn. Hist. d. Moll. tab.  
2. f. 42.

*Var. α. Testa conico-oblonga, crassiore, anfractibus convexis.*

— β. *Testa magis elongato-attenuata.*

— γ. *Testa anfractibus planiusculis.*

*Animal* griseo nigricans. *Testa* animale foeta fusca, spira sæpius nigra.

*Testa* a præcedente differt magnitudine plerumque minori, testa obscura, griseo-fusca vel nigricante, fasciis nullis albis aut purpureis ornata. Spira exserta, conico-acuta, anfractibus plerumque sex, rarius  $6\frac{1}{2}$  aut 5, transversim striatis, ultimo, ut in antecedenti, rugis obsoletis spiralibus aut reticulatis notato. Apertura ovata, pro longitudine plerumque latior quam in præced. intus rufa vel purpurascēte. Plica columellæ minus quam in *palustri* exserta & compressa. Fissura umbilicalis parva, interdum nulla.

*Obs.* Variat testa vel magis ventricosa vel magis attenuata, anfractibus jam convexis sutura profunda,  
jam

jam planiusculis, sutura subobsoleta. Apertura plerumque brevior quam spira; interdum tamen præsertim in junioribus, apertura spiram aut æquat aut superat.

*Habitat* in fossis, paludibus, amnibus &c., in Scania vulgaris.

## 9. *Lymnæa elongata*.

*L. testa conico-cylindræa, acuta, imperforata pellucida, pallide fuscescente; apertura ovato-oblonga.*

Long. 14. lat. 4; apert. 5. spir. 10. millim.

*Buccinum glabrum*, Müll. Verm. hist. p. 135. n. 328.

*Limnæus elongatus*, Draparn. Hist. des Moll. p. 53.

t. 3. f. 34. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 92. t. 4. f. 28.

*Lymnæa leucostoma*, Lamarck Hist. des anim. s. vert.

VI. 2. p. 162.

*Variat: testa brevior, elongato-conica, acuta; anfractibus senis infimo brevior & magis convexo; peristomate interdum intus albo marginato. — Fig. Pfeiff. citata.*

*Animal* . . .

*Testa* conico-cylindræa, apice acuminato, imperforata, tenuis, subtilissime striata, pellucida, magis vel minus nitida, pallida vel luteo-fuscescens. Spira, aperturâ duplo longior, anfractibus septenis convexis,

vexis, sutura sat profunda alba. Apertura ovato-oblonga, superne angustata; peristomate tenui, acuto, in variet.  $\alpha$ . callo intus albo munito. Plica columellæ exserta. Fissura umbilicalis nulla.

*Habitat* in paludibus Smolandiae, unde eam misit Amic. *Boheman*. In Scania nondum reperta.

# 10. *Lymnaea minuta*.

*L. testa ovato-oblonga, acuta, perforata, cinerea, pellucida; anfractibus quinis convexis, superne subtruncatis; apertura ovata, utrinque rotundata.*

Long. testæ 9; apert.  $4\frac{1}{2}$ ; spir. 5 millim.

*Lymnaea minuta*, Lamarck Hist. des anim. s. vert. VI.

2. p. 162.

*Limnaeus minutus*, Draparn. Hist. des Moll. p. 53. t.

3. f. 5, 6. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 93.

t. 4. f. 27.

*Buccinum truncatulum*, Müll. Verm. hist. p. 130. n.

325.

*Helix limosa*, Linn. Fn. Sv. p. 531? — Schröter

Flussconch. t. 7. f. 13.

*Animal* supra fusco-griseum, subtus albidum.

*Testa* ovato-oblonga, pallide cinerea, pellucida, sed plerumque limo obducta & tunc fusco-nigra vel atra (ut descriptio Mülleriana & figura Schröteri illam depingunt). Spira conica, exserta, acuta, anfractibus quinis vel  $5\frac{1}{2}$  convexis, superne obtusis, subtruncatis; transversim striatis sutura profunda.

Aper-

Apertura ovata, superius rotundata, neque ut in plurimis angulata, parum brevior quam spira. Peristoma simplex, acutum, margine columellari tantum reflexo fissuram umbilicalem monstrante.

*Habitat* in stagnis & fossis fundo limoso. Aquam frequenter relinquit & in lapides aliaque corpora sicca se confert.

## VIII. PLANORBIS. Müll.

*Animal* tentaculis duobus setaceis, longis, basi intus oculiferis; pede breviusculo, æquilato, antice & postice rotundato; foramine pro respiratione sinistro.

*Testa* discoidea; spira depressa; anfractibus omnibus utrinque conspicuis; apertura lunata vel rotunda & anfractu penultimo plerumque excisa; peristomate simplici, margine laterali longius producto; operculo nullo.

\* *Anfractu ultimo subtereti, ecarinato.*

### 1. Planorbis contortus.

*P. testa supra plana cum fossula centrali, subtus patulo-umbilicata; apertura arcuato-lunata.*

Diam. 3 — 5 millim.

*Pla-*



*Planorbis contortus*, Müll. Verm. hist. p. 162. n. 348.  
 Draparn. Hist. des Moll. p. 42. t. 1. f. 39-41.  
 (fig. egregiæ). — Pfeiff. Land- u. Wasserschn.  
 p. 81. t. 4. f. 11. — Lam. anim. s. vert. VI. 2.  
 p. 154.

*Helix contorta*, Linn. Faun. Sv. p. 528. n. 2181. —  
 Gmel. Syst. p. 3624. n. 37.

*Animal* griseo-nigricans, margine pedis & tentaculis albidis.

*Testa* fulvo-fusca, tenuis subtiliter oblique striata, subnitida, in aqua tota deaurata, supra plana cum puncto centrali cavo, subtus concava aut patule umbilicata. Anfractus 6—7 utrinque conspicui, extus teretes, arcte convoluti & sibi invicem perpendiculariter adpressi. Apertura parva, arcuato-lunata, seu lunæ instar in primo quadrante.

*Habitat* in plantis aquaticis fossarum, paludum & fluviorum, frequens.

## 2. *Planorbis corneus*.

*Pl. testa* fusca, crassiuscula, supra umbilicata, subtus fere plana; apertura rotundato-lunata.

Diam. 20 — 30 millim.

*Planorbis corneus*, Draparn. Hist. des Moll. p. 43. t. 1. f. 42—44. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 77. t. 4. f. 3. 4. — Lam. Hist. anim. s. vert. VI. 2. p. 152.

*Planorbis purpura*, Müll. Verm. hist. p. 154. n. 343.

*He-*

*Helix cornea*, Linn. Faun. Sv. p. 527. — Syst. Nat. p. 1243. n. 671. — Schröt. Flussconch. t. 5. f. 19—21.

*Variet. α. Fossularum seriebus transversis scrobiculata.*

*Animal* nigrum, tentaculis griseis.

*Anatomiam* figuris optimis illustratam dedit Cuvier in citatis: Memoires, pour servir à l'histoire & à l'anatomie des Mollusques. Paris 1817.

*Testa* magna, crassiuscula, parum pellucida, tenuiter striata, (striis anfractuum majorum transversis, mediorum decussatis, minorum præsertim longitudinalibus), fusca, castaneo-fusca vel nigricans, apud nos sæpius unicolor, interdum subtus vel utrinque pallidior, lutescens vel albida, subtus fere plana, parum concava, supra profunde umbilicata. Anfractus quini teretes, quorum ultimus maximus, primo & secundo minimis. Apertura lunato-rotundata, obliqua, intra marginem fascia purpurea.

*Testa pulli*: albida, pellucida, tenuis, pube subhispida, striata, striis decussatis, longitudinalibus imprimis conspicuis.

Pfeiff. l. c. t. 7. f. 7. — *Planorbis similis*, Müll. Verm. hist. p. 166.

*Habitat* in fessis, paludibus & fluviis vulgaris.

### 3. *Planorbis hispidus*.

*Pl. testa* hispida, transverse spiraliterque striata, tenui, pellucida, supra planiuscula centro excavata.

*cavato, subtus umbilicata. Apertura larga subrotunda.*

Diam. 4 — 5 millim.

*Planorbis hispidus*, Draparn. Hist. des Moll. p. 43. t. 1. f. 45-48. — Lamarck Hist. des Anim. s. vert. VI. 2. p. 154.

*Planorbis albus*, Müll. Hist. Verm. p. 164. n. 350. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 80. t. 4. f. 10.

*Animal* capite & collo supra griseis, tentaculis & pede albidis. Testa animale foeta fusca vel pellucida, ita ut motus cordis facile observari possit.

*Testa* tenuis, pellucida, fulva vel rufescens vel albida, supra planiuscula cum fossula centrali, subtus umbilicata. Anfractus 3 — 4 teretes, vel subdepresso-teretes, extimo ceteris multo majori sine ullo vestigio anguli aut carinae, decussatim striati, striis longitudinalibus (spiralibus) rarioribus, transversis subtilissimis confertis. Spinulae, quibus hispida est testa, oculo nudo vix conspiciuntur; armato autem formam elongato-conicam praebent. Caducae vero sunt & fragiles. — Apertura pro magnitudine testae, larga, ovali-rotunda, obliquissima, margine laterali ante umbilicalem valde prominente.

*Habitat* in fluviis & fossis haud raro. In Höjeå ad Lund frequens. Ex Uplandia misit D. Marklin.

#### 4. *Planorbis imbricatus.*

*Pl. testa supra planiuscula, subtus umbilicata, subtilissime transversim striata; anfractu ultimo*  
la-

*lamellis transversis elevatis extus cincto; apertura rotunda, dilatata.*

Diam. 2 millim.

*Planorbis imbricatus*, Müll. Verm. hist. p. 165. — Draparn. Hist. des Moll. p. 44. t. 1. f. 49-51. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 84. t. 4. f. 15, 16. — Lam. Hist. d. Anim. s. vert. VI. 2. p. 155.

*Turbo nautilus*, Linn. Syst. p. 1241. n. 654. — Gmel. Syst. p. 3612. n. 98. — Maton, Act. Soc. Lin. VIII. p. 169. t. 4. f. 4.

*Animal* albidum. Testa animale foeta fusca.

*Testa* tenuissima, pellucida, pallida fulva vel albida, supra plana, subtus umbilicata. Anfractus terni, depresso-teretes, minime carinati, sed pagina superna subplanulati, inferna magis convexi, transversim subtilissime striati, præterea lamellis elevatis transversis, rarioribus, cincti; quæ tamen lamellæ non nisi in anfractu ultimo conspiciuntur, suntque in ora ejus extima, quam carinam temere appellant, maxime elevatæ, unde hæc ora, a latere superiori vel inferiori testæ inspecta, dentata videatur. Alii enim dentes, quam lamellæ hîc magis elevatæ, non exstant. Apertura larga, subdilatata, circinata, non tam obliqua quam in specie antecedente. Peristoma continuum.

*Obs.* Lamellæ facile absterguntur, ut jam monuit cel. Müller, & ita delentur ut tantum earum vestigia, lumini obversa conspiciantur; interdum hæc quo-



quoque evanescent ut testæ striulæ transversæ solum appareant. — Lamellæ dictæ, quales in speciminibus integris exstant, in figuris Draparnaudi & Pfeifferi non satis distincte expressæ sunt. Figura *Matoni* optima — Inter *Plan. cristatum* & *imbricatum* Drap. differentia specifica vix ulla esse videtur.

*Habitat* in Algis, aliisque plantis aquaticis fossarum & piscinarum. In fossis & stagnis circa Lund haud rara, passim frequens, ex. gr. in fossa juxta *Lilla Råby*, in piscina horti ad *Trolleberg* &c. Ex Uplandia eam misit D. *Marklin*.

### 5. *Planorbis spirorbis*.

*Pl. testa utrinque subconcava; anfractibus subteretibus sensim crescentibus, ultimo inferius obsolete angulato; apertura parva.*

Diam. 5 — 6 millim.

*Planorbis spirorbis*, Müll. hist. Verm. p. 161. n. 347.

— Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 79. t. 4. f. 8.

— Lamarck Hist. des anim. s. vert. VI. 2. p. 153.

*Helix spirorbis*, Linn. Faun. Sv. p. 528.

*Planorbis vortex* β. Draparn. Hist. des Moll. p. 45.

t. 2. f. 6, 7.

*Animal* supra fuscum tentaculis & pede pallide rubicundis.

*Testa* pallide fuscescens vel flavescens, subpellucida, parum nitida, tenuissime striata, utrinque, præsertim subtus concava. Anfractus quini, subteretes, parum crescentes, cylindracei. Apertura parva obliqua, rotunda vel subangulata.

*Va-*

Variat anfractu extimo vel plane tereti, vel extus inferne obsolete angulato; aperturâ in illa tereti, in hac subangulata. Variat etiam colore, in aliis pallide lutescente, in aliis subfulvo in aliis fusco.

*Monstrositates* hujus speciei interdum occurrunt inter quas, ni fallimur, numerandus est *Planorbis deformis*, Lam. l. c. p. 154.

*Habitat* in fossis paludibus & fluviis, plantis aquaticis adhærens.

\*\* *Anfractu ultimo carinato vel angulato.*

## 6. *Planorbis vortex*.

*Pl. testa supra concava, subtus plana; anfractibus sensim crescentibus, ultimo inferne acute angulato; apertura ovato-acuta.*

Diam. 6 — 10. millim.

*Planorbis vortex*, Müll. Hist. Verm. p. 158. n. 345.

— Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 79. t. 4. f. 7.

— Drap. Hist. des Moll. p. 44. Var.  $\alpha$ . t. 2. f. 4, 5.

— Lam. Hist. d. anim. s. vert. VI. 2. p. 154.

*Helix vortex*, Linn. Faun. Sv. p. 527. — Gmel. Syst. Nat. p. 3620.

*Animal* rufum tentaculis albis.

*Testa*, ad antecedentem speciem proxime accedens, pallida, lutescens, pellucida, tenuissime striata, supra convexiuscula, subtus planissima. Anfractus 6 — 7 sensim crescentes, ultimo supra convexo, subtus plano, extus ad plagam inferam in angulo

gulum acutum compresso. Apertura subovata, extus acute angulata; peristoma acutum, margine superiore supra inferiorem valde prominente.

*Habitat* in plantis aquaticis fossarum, paludum & amnium, haud raro.

## 7. *Planorbis marginatus*.

*Pl. testa utrinque concava, subfusca, anfractibus convexis, extimo majori, deorsum marginato; apertura rotundato-ovali.*

Diam. 12 — 14 millim.

*Planorbis marginatus*, Draparn. Hist. des Moll. p. 45. t. 2. f. 11. 12. 15. — Pfeiff. Land- u. Wasserterschn. p. 75. t. 4. f. 1, 2.

*Planorbis umbilicatus*, Müll. Hist. Verm. p. 160. n. 346.

*Helix planorbis*, Linn. Fauna Sv. p. 527.

*Animal* nigrum, tentaculis pallidis subrubicundis.

*Testa* fusca, plerumque tegumine nigro-fusco illita, interdum pallida, fere obscura vel parum nitida, subpellucida, transversim oblique striata, supra & subtus medio concava. Anfractus 5—6, utrinque, præsertim supra convexi, extimo ceteris ampliore, deorsum cincto margine seu linea elevata, quæ, testâ pronâ jacente, latet, supinâ conspicitur. Apertura rotundato-ovalis, utrinque subangulata, angulo interiore a carina remoto; peristomate acuto.

*Juniorum* testa brunnea vel pallida, nitida pellucida, anfractu extimo margine destituto, sed deorsum subangulato, superne convexiore, inferne planiore;

ore; qua nota a *Pl. hispido* facile & sine lenticulo oculari dignoscitur.

*Habitat* in aquis stagnantibus, paludibus, fossis &c. vulgaris.

## 8. *Planorbis carinatus*.

*Pl. testa supra centro concava, subtus planiuscula; anfractibus depressis, extimo majori, carina media acuta; apertura ovali utrinque angulata.*

Diam. 12 millim.

*Planorbis carinatus*, Müll. Hist. Verm. p. 157. n. 344.

— Draparn. Hist. des Moll. p. 46. t. 2. f. 13.

14. 16. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 76.

t. 4. f. 5, 6. — Sturm Fauna VI. 3. cum figg.

*Animal* griseo-nigricans marginibus pedis & tentaculis albidis.

*Testa* præcedenti valde affinis, sed magis depressa, pellucida & nitida, supra centro concava, subtus planiuscula. Anfractus quattuor convexo-planiusculi, extimo latiore & magis depresso quam in *Pl. marginato*, in carinam mediam, acutam, utrinque conspicuam extus abiente. Apertura ovalis utrinque angulata; angulo interiore carinæ approximato. Peristoma acutum.

*Habitat* in fossis & lacubus, raro. In lacu Ring-sjö Scaniæ inventa.



# 9. *Planorbis nitidus*.

*Pl. testa supra depresso-convexa cum fossula centrali, subtus planiuscula, profunde umbilicata; anfractu extimo deorsum angulato; apertura cordata.*

Diam. 5 millim.

*Planorbis nitidus*, Müll. Verm. hist. p. 163. n. 349. (Descriptio accuratissima). — Draparn. Hist. des Moll. p. 46. t. 2. f. 17 — 19. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 82. t. 4. f. 12.

*Helix complanata*, Linn. Faun. p. 527.

- *Animal* - - -

*Testa fusco-flavescens vel fulva, nitida, pellucida, tenuissime striata. Anfractus quattuor, quorum extimus ceteris simul sumtis duplo latior, supra convexus, subtus planus, extus ad paginam inferam angulatus "vicinum ita includit, ut minima ejus pars supra conspiciatur, subtus fere nulla, hinc interiores supra & subtus umbilicum formant, hac tamen differentia, quod centrum paginæ superioris parum cavum anfractus numerare permittat, inferioris vero angustius & ad verticem usque perforatum, anfractus minus clare monstret". (Müll. l. c.). Apertura cordata; peristomate acuto.*

*Habitat* in plantis aquaticis fossarum & paludum, passim.

## XIV. ANCYLUS. Geoffr.

*Animal* testâ penitus tectum; tentaculis duobus subulatis, obtusis, basi compressis, vel triquetris; juxta basin intus oculiferis. Caput antice vexillo emarginato. Corpus ovale, breve, disco subtus longitudinali plano.

*Testa* absque spira, oblique conica, corpus totum obtegens; vertice acuto recurvo; apertura ovali, marginibus simplicissimis.

### 1. *Ancylus lacustris*.

*A. testa* semi-elliptica, membranacea; mucrone verticis subcentrali, sinistrorsum reflexo; apertura ovato-oblonga.

Diam. longit. 6; transvers. 3 millim.

*Ancylus lacustris*, Müll. Verm. hist. p. 199. n. 385.

— Draparn. Hist. des Moll. p. 47. t. 2. f. 25.

27. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 109. t. 4. f. 46.

*Patella lacustris*, Linn. Faun. Sv. p. 534. — Syst. Nat. p. 1260. n. 769.

*Animal* albidum, pellucidum, dorso subgriseo; tentaculis brevibus, extra marginem testæ haud exserendis; pede ovali antice & postice rotundato.

*Testa* quoad circuitum ovato-oblonga, alba, pellucida, tenerrima, limo sæpe epidermidis instar obducta, unde nigricans & subopaca; supra convexa,  
ver-

vertice subcentrali, mucrone minimo, acuto, pone centrum testæ sinistrorsum recurvato; subtus conca-  
va, nitidissima, marginibus acutis, simplicissimis.

*Habitat* in lacubus & fluviis lente fluentibus, plantis aquaticis adhærens, passim. In amne Höjers ad Lund in foliis Nymphææ luteæ; in lacu Odensiö &c.

## 2. *Ancylus fluviatilis*.

*A. testa fornicata conoidea, cornea; vertice excentrico, recurvato; apertura subrotundo-ovali.*

Diam. long. 6; transvers. 5 millim.

*Ancylus fluviatilis*, Müll. Verm. hist. p. 201. n. 386.

— Draparn. Hist. des Moll. p. 48. t. 2. f. 23.

24. — Lamarck Hist. des Anim. s. vert. VI. 2.

p. 27. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 107.

t. 4. f. 44. 45. Id. t. 1. f. 16.

*Patella fluviatilis*, Gmel. Syst. p. 3711. n. 98.

*Animal* cinereum punctis minutissimis albis quasi arena adpersum, tentaculis & pedis marginibus pallidis. Incedente animale, tentacula extra marginem testæ exseruntur.

*Testa*, quoad perepheriam, ovalis vel rotundato-ovalis, sordide lutescens, pellucida, tenuis sed tamen magis calcarea & dura quam præcedens, transversim obsolete rugosa, longitudinaliter subtilissime striata, striis a vertice ad peripheriam undique ductis; supra valde convexa seu fornicata, vertice pone centrum sito, mucrone obtusiusculo, recurvato,  
mar-

margini testæ posteriori fere perpendiculari; subtus concava, nitidissima, cœrulescens.

*Habitat* in rivulis, lapidibus insidens, rarius. In rivulo ad *Fogelsång* prope Lund; in rivulo ad *Fröllinge* Hallandiæ, &c.

---

## XV. VALVATA. Müll.

*Animal* tentaculis duobus setaceis, basi postice oculiferis; pede brevi, antice bilobo, postice rotundato; ore proboscidiiformi; branchiis instar folii pinnati supra tentaculum dextrum exsertilibus, corpusculo cylindrico obtuso, tentaculum tertium mentiente, dextrorsum addito.

*Testa* operculata discoidea vel conoidea; anfractibus cylindraceis; cavitate spirali integra; apertura circulari; peristomate continuo, acuto.

### 1. Valvata piscinalis.

*V. testa* globoso-conoidea, umbilicata; spiræ anfractibus quaternis, apice obtusa.

Diam. basis 4 — 5; axis 4 millim.

*Valvata piscinalis*, Lam. Hist. des Anim. s. vert. VI.

2. p. 172.

*Valvata obtusa*, Pfeiff. Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 98. t. 4. fig. 32. Id. t. 1. f. 13.

Ne-



*Nerita piscinalis*, Müll. Verm. hist. p. 172. n. 358.

*Helix piscinalis*, Gmel. Syst. p. 3627. n. 44.

*Cyclastoma obtusum*, Draparn. Hist. des Moll. p. 33.

t. 1. f. 14.

*Variet. α. testa minore magis striata, anfractibus* 4 — 4½.

Diam. bas. 3 millim.

*Nerita pusilla*, Müll. l. c. p. 171.

*Obs.* Quoad formam & numerum anfractuum exacte refert *V. piscinalem*, a qua tantum magnitudine minori & striis magis conspicuis differt; quare pro varietate quam pro specie rectius, ut videtur, illam habeas. Variat præterea hæc species spirâ altiore & magis conica vel humiliore & magis globosa.

*Animal* albidum proboscide cylindraceo, griseo, transversim rugoso, truncato; pede dilatato, antice bilobo, lobis triquetris, acuminatis, extrorsum flexis, postice rotundato, subemarginato. Tentacula longa, cylindracea, apice obtusiuscula. Supra dextrum exseritur branchia, folii pinnati instar. Ad latus dextrum, juxta suturam spiræ, exseritur membrum (filum branchiale LAM.) tentaculo simile, sed parum brevius & crassius.

*Testa* globoso-conoidea pallide fusca aut lutescens, pellucida subnitida, subtiliter striata, umbilicata. Anfractus quattuor vel 4½ teretes, ultimo maximo, ceteris in apicem spiræ conoideæ obtusum subito decreascentibus. Sutura profunda. Apertura circinata; peristomate simplici. Operculum corneum, extus striis circularibus & fossula centrali notatum. Umbilicus apertus, profundus. *Te-*

*Testa junioris* anfractibus 3 — 3½, spira magis depressa seu depresso globosa, apertura circinata, patula.

*Obs.* Hoc in omnibus cochleis conoideis obtinet, quod spira in junioribus magis depressa videatur quam in adultis.

*Habitat* in fluviis & fossis, plerumque fundo limoso, per totam fere Scandinaviam, a Scania, ubi in Höjeå juxta Lund obvenit, usque in Jemtlandiæ aquas subalpinas, ubi eam legit & mecum benigne communicavit Dr. A. Retzius.

## 2. Valvata cristata.

*V. testa discoidea, supra plana, subtus umbilicata; anfractibus ternis; peristomate simplici.*

Diam. 2 — 3 millim.

*Valvata cristata*, Müll. hist. Verm. p. 198. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 101. t. 4. f. 35.

*Valvata planorbis*, Draparn. Hist. des Moll. p. 41. t. 1. f. 34, 35.

*Testa* discoidea, pallide fusca aut lutescens, pel-lucida, subnitida, tenuissime striata, supra plana sub-tus concava seu patulo umbilicata. Anfractus tres, teretes. Apertura circinata, peristomate simplici. Oper-culum tenue corneum, lineis concentricis notatum, aperturam aliquantulum intrans.

*Habitat* in fossis, stagnis & paludibus, a Scania usque in Lapponiam, haud raro.

## XVI. PALUDINA. Lam.

*Animal* tentaculis duobus setaceo-subulatis, ad basin extus oculiferis; ore proboscidiiformi; branchiis pectiniformibus, cavitate propria conditis.

*Testa* operculata, ovata vel conoidea, anfractibus convexis vel rotundatis; cavitate spirali ab anfractu proximo subexcisa; apertura rotundo-ovata, superne angulata; peristomate continuo, acuto.

### 1. Paludina vivipara.

*P. testa ovato-conoidea, ventricosa, tenui, perforata; anfractibus subsenis teretibus, fusco fasciatis; spira obtusa, submucronata.*

Long. 26—28; Lat. 20 millm.

*Paludina vivipara*, Lam. Hist. des Anim. s. vert. VI.

2. p. 173. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 103. t. 4. f. 43. (42. operc.)

*Nerita vivipara*, Müll. Verm. hist. p. 182. n. 370. —

Sturm Fauna VI. 2. cum fig.

*Helix vivipara*, Linn. Faun. Sv. p. 529. — Syst. Nat.

p. 1247. n. 690.

*Obs. Animal*, (cujus anatomiam descripsit & figuris egregiis ornavit Illustr. Cuvier, in *Memoires pour servir à l'hist. & à l'anat. d. Moll. Paris 1817. 4:to*) viviparum est. In singula testa feminea, per æstatem

tem inveniuntur 6—8 Embryones, magnitudine inæquales, testa subglobosa, pellucida, obsolete fasciata, subtus convexissima, imperforata, supra magis planulata, spira brevi mucronata. Vide Pfeiff. l. c. t. 7. f. 22.

*Testa* ovato-conoidea, ventricosa, fusco-virescens, tenuis, pellucida, tenuissime striata. *Spira* conoidea, obtusa, vertice jam mucronato, jam eroso & obtuso; anfractibus 5—6 tereti-convexis, subturgidis, primo mucronem formante, minimo, acuto, infimo ceteris majori, subventricoso. Fasciæ spirales rufo-fusæ, in anfractu ultimo tres, quarum duæ in penultimo continuantur. Sutura profunde exarata. Apertura ovato-rotunda, superne subangulata. Peristoma intus nigro-fuscum, simplex, acutum, margine columellari aliquantulum reflexo, unde umbilicus magis vel minus oblectus est. Operculum corneum, brunneum, lineis inæqualibus concentricis striatum, extus obscurum centro concavo, intus nitidum centro convexo.

*Variat* testa fusco-virescenti fasciis obsoletis, & testa pallide virescenti fasciis distinctis.

*Habitat* in lacubus & fluviis Sveciæ superioris. In Scania rarius obvia, ex. gr. in amne ad *St. Köpinge*, &c.

## 2. *Paludina impura*.

*P. testa* ovato-conica, lævi, pellucida, imperforata; anfractibus quinis, ultimo subventricoso; spira acuta.

Long. 10—12; Lat. 6—7 millim.

*Pa-*



*Paludina impura*, Lam. Hist. des Anim. s. vert. VI. 2.  
p. 175. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 104.  
t. 4. f. 40, 41.

*Cyclostoma impurum*, Draparn. Hist. des Moll. p. 36.  
t. 1. f. 19, 20. — Sturm Fauna VI. 3. cum fig.

*Nerita jaculator*, Müll. Verm. hist. p. 185. n. 372.

*Helix tentaculata*, Linn. Fauna Sv. 531. — Syst. Nat.  
p. 1249. n. 707.

*Variet. α. Testa magis elongatâ. Drap. l. c. t. 1.  
f. 19.*

— *β. Testa magis ventricosa. Drap. t. 1. f. 20.*

*Animal* nigricans punctis auratis adpersum.  
Pes antice bilobus, postice angustatus, subacutus. Ten-  
tacula longa setacea. Oculi nigri.

*Testa* ovato-acuta, lævis, pellucida, nitida, pal-  
lide cornea vel lutescens, absque maculis aut fasciis,  
plerumque vero crusta limosa & obscura obducta.  
Spira anfractibus quinque convexis, infimo subventrico-  
so, ceteris successive minoribus, vertice acuto. Su-  
tura sat profunda. Apertura rotundo-ovata, superne  
angulata. Peristoma acutum, intus album, nitens, sub-  
marginatum. Operculum lineis concentricis striatum.  
Fissura umbilicalis nulla.

*Habitat* in fossis, fluviis, stagnis & lacubus,  
vulgaris.

### 3. *Paludina balthica*.

*P. testa oblongo-conica, lævi, sub epidermide virescente albida; anfractibus subsenis; spira producta, subacuta.*

Long. 3 – 7 millim.

*Obs.* *Cyclostomati acuto*, Draparn. Moll. p. 40. t. 1. f. 23. subsimilis, sed aliquantum magis ventricosa & major anfractibus plerumque paucioribus. Cum *Cyclostomate anatino*, Drap. quod cum *Paludina muratica* LAM. identica dicitur, magis convenire videntur testæ juniores magnitudine, numero anfractuum &c.

*Animal* album, proboscide & pede supra nigricantibus, tentaculis pure albis. Pes antice dilatatius, truncatus, subemarginatus, postice rotundatus, utrinque incisus. Tentacula longa, setacea, oculis ad basin extus. Proboscis longa, cylindracea; truncata, transversim rugosa, apice subbifida. Testa animale facta saturate olivacea ubi non erosa & dealbata est.

*Testa* oblongo-conica, lævis, parum nitida, subpellucida, epidermide viridi in statu integro vestita, sed plerumque, præsertim anfractibus superioribus, decorticata vel erosa, & hinc albida. Spira anfractibus quinis, vel senis, rarius septenis tereti-convexis, æquabiliter crescentibus. Sutura profunda. Vertex in statu integro acutus, sed plerumque erosus & subobtusatus. Apertura rotundato-ovata, peristomate simplici, subpatulo, acuto. Operculum, aperturam intrans, nitidissimum, striulatum. Fissura umbilicalis obsoleta.

*Hæ-*

*Habitat* in aqua parum salsa maris balthici fucis & lapidibus plerumque adfixa. Juxta *Esperöd* frequenter obvenit simul cum *Lymnæa balthica* & *Neritina fluviatili*.

#### 4. *Paludina octona*.

*P. testa conico-oblonga, fulvo-fusca, lævi, pellucida, nitidissima; anfractibus octonis, spira producta acutissima.*

Long. 6 millim.

*Helix octona*, Linn. Syst. Nat. p. 1248. n. 698.

An *Cyclostoma acutum*, Drap. Moll. p. 40. t. 1. f. 23 ?

*Animal* - - - nondum examinavimus.

*Testa* præcedente gracilior & magis elongata, fulvo-fusca vel virescens, lævis, pellucida, valde nitida. Anfractus octoni, convexi, sensim crescentes; spira producta, acutissima. Apertura exacte ovata, peristomate acuto, patulo. Fissura umbilicalis obsoleta.

*Obs.* Hanc esse veram *Helicem actonam* Linn. Syst. Nat. p. 1248. n. 698. & descriptio Linneana & patria utriusque docet. *Cyclostomati acuto*, Draparn. t. 1. f. 23. haud absimilis, sed differt forma magis elongata & anfractibus octo.

*Habitat* - - - Specimen descriptum ante aliquot annos in Scania reperi; locum vero specialem in memoriam jam revocare non possum.

## XVII. NERITINA. Lam.

*Animal* tentaculis duobus setaceis, ad basin extus oculiferis; pede brevi, utrinque rotundato.

*Testa* operculata, subtenuis, semiglobosa vel ovata, subtus planulata, non umbilicata; apertura semirotunda, labio columellari plano, acuto; labio laterali nec dentato nec crenulato; operculo dente laterali instructo.

### 1. Neritina fluviatilis.

*N. testa subovata, dorso convexa, glabra, nigro & lutescenti diversissime variegata; spira brevissima, laterali; labio columellari edentulo.*

Diam. long. 7. transv. 10 — 12 millim.

*Nerita fluviatilis*, Linn. Faun. Sv. p. 532. n. 2194. — Müll. Hist. Verm. p. 194. n. 381. — Draparn. Hist. des Moll. p. 31. t. 1. f. 3-4. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 106. t. 4. f. 38—39.

An *Neritina fluviatilis*, Lam. Hist. des Anim. s. vert. VI. 2. p. 188? (At *labium* in nostra minime *denticulatum*).

*Animal* album capite & collo supra nigris, pede postice rarius nigro maculato. Tentacula longa setacea, alba, supra longitudinaliter nigro sublineata. Oculi nigri in eminentia ad basin tentaculorum extus siti.

*Te-*



*Testa* plerumque subtenuis, sed tamen robustiuscula interdum crassior, fere ovata, supra convexa, subtus planiuscula, glabra, nigra, maculis luteis vel albidis parvis jam tessulata, jam ex nigro & lutescenti transversim undulato-lineata; rarius unicolor fusca, nigricans aut cœrulescens. Anfractus duo, ultimo maximo, totam fere testam efficiente, altero minimo spiram lateralem brevissimam formante. Apertura semirotunda, nitida, labio columellari plano, margine acuto, plane edentulo; peristomate tenui, acuto. Operculum semirotundum, extus nitidum, striisque subtilibus notatum, intus ad alterum angulum processu hamoso munitum.

*Variet. β. minor subunicolor nigrofusca aut obsolete variegata.*

*Habitat* in rivis & in lacubus ad ostia rivorum, haud raro. Var. *β.* ad litora maris balthici, fucis & lapidibus adhærens, procul interdum ab ostiis fluviorum.

*Obs.* Mare balthicum, quod, ut jam monuimus, plures Molluscorum species alit, quæ aliàs aut aquæ dulcis incolæ, aut his maxime adfines sunt, continet quoque pauca quædam *Mollusca* vere *marina*, ut *Mytilum edulem* Linn., *Cardium edule* Linn. *Myamarenariam* Linn. & duas vel tres *Tellinæ species*, quas inter *Tellinam balthicam*, Linn. &c. Sed notatu dignum videtur, omnia *Mollusca marina*, quæ in mari balthico invenimus, statu tantum pygmæo nobis sese obtulisse.

## XVIII. CYCLAS. Lam.

*Animal*: Pallium antice, pro pede exerendo, apertum. postice connatum & intubum vel geminum vel simplicem, contractilem, cujus apertura superior ani, inferior tracheæ vicibus fungitur, extensum. Pes valde extensilis, subteres, longus & angustus.

*Testa* corticata, subglobosa vel ovata, transversa, æquivalvis, clausa, natum umbo-  
nibus tumidis. Dentes cardinales minuti, vel in utraque valva duo, quorum unus complicatus; vel in altera duo in altera unicus complicatus. Dentes laterales transversim elongati, compressi, lamelliformes in valvula dextra subduplicati. Ligamentum externum, lateri breviori insitum \*).

\* *Te-*

---

\*) In speciebus scil. distincte inæquilateris. Hunc characterem cum paucis quibusdam Generibus communem habet, ex. gr. cum *Donace*, *Tellina*, *set*,

\* *Testa subœquilatera, subrotunda; siphone longo, duplici.* (CYCLAS, Pfeiff.)

# 1. *Cyclas cornea.*

*C. testa subglobosa, ventricosa, tenui, tenerissime striata, virescenti-fusca; zona lutescente, submarginali; ligamento cardinali inconspicuo.*

Latit. 10 — 11 millim.

*Cyclas cornea*, Lamarck, Hist. des Anim. s. vert. V. p. 558. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 120. t. 5. f. 1, 2. & tab. 1. f. 18.

*Cyclas rivalis*, Draparn. Hist. des Moll. p. 129. t. 10. f. 4, 5.

*Tellina rivalis*, Müll. Verm. hist. p. 202.

*Tellina cornea*, Linn. Faun. Sv. p. 517. n. 2138. — Schröter Flussconch. t. 4. f. 4. — Sturm Fauna VI. 2. cum figg.

*Animal* album, viviparum. *Siphones*, sive tubi, a pallio ad extremitatem posticam confecti, basi con-nati, apice distincti; superiore, intra quem anus terminatur, aliquantum brevior, subconico apertura parva apice perforato; inferiore, qui, aquam ad branchias ducendo, trachæ vicibus fungitur, longiore, cylindræo, truncato, apertura ampliata margine integerrimo. *Pes*, sive organum, valde extensile, quo progreditur animal, infra extremitatem siphonibus oppositam (h. e. infra extremitatem anticam) protenditur. Quando animal incedere vult, pedis extra testam extensi extremitatem corpori alieno affigit;

git ; hac vero affixa, pedem contrahendo, testam adtrahit. Sic pergendo movetur gressibus sat celeribus. *Branchiæ* foliaceæ, utrinque duæ, transversim striatæ, exteriorē minore, medietatem tantum posticam testæ occupante, interiorē majore, ad os usque protenta.

*Testa* subglobosa, ventricosa, tenuis & fragilis, parum nitida, transversim tenuissime striata, extus sordide virescenti-fusca, lutescenti tineta, zonaque sublutea, jam marginali jam media picta ; intus cœrulescens. Natum umbones prominuli, tumidi. Dens cardinalis valvæ dextræ unicus, formam literæ c fere referens ; dentes valvæ sinistræ cardinales duo, anteriore complicato, posteriore simplici, compresso, obliquo. Ligamentum cardinale extus vix conspicuum.

*Obs.* Animal viviparum est ; pulli enim testa tecti, in interiori laminarum, quæ *branchiæ* vulgo appellantur, inclusi, per ætatem frequenter obveniunt. Scilicet in sacculo membranaceo proprio, superius ad basin branchiæ adfixo, inferius in cavitate branchiali libero, continentur pulli 2 — 5, per funiculum capillarem basi pedis, eodem loco quo *byssus* plurium bivalvium, insitum adfixi, testâ hyalinâ, ovali, compressissimâ, distincte striatâ tecti, facultate pedem & siphones exserendi jam præditi. Motus cordis, branchiæ, muscoli transversales &c. facillime perspiciuntur. Occurrunt in eadem testa, immo in eadem lamina branchiali, pulli magnitudine & ætate varii. Aequales vero in eodem sacculo proprio simul continentur. — Maternam testam sero relinquere videntur ;



tur; nam in testa quæ ipsa non plusquam 10 millim. latit. æquabat, invenimus pullos variæ magnitudinis, quorum quidam 3 millim. lat. habebant.

*Habitat* in fossis, piscinis & amnibus, fundo limoso, haud raro.

*Observ.* *Cyclas rivicola*. C. testa globoso-ovali, ventricosa, solidiuscula, eleganter striata, fusca vel virescente; zona lutescente marginali; ligamento cardinali conspicuo. Latit. 23 millim.

*Cyclas rivicola*, Pfeiff. l. c. p. 121. t. 5. f. 3, 4, 5.

*Habitat* in fluviiis Britanniae, Galliae, Germaniae &c. In peninsula Scandinavica nondum inventa.

## 2. *Cyclas lacustris*.

C. testa orbiculato-subrhombica, compressa, tenui, pellucida, tenuiter striata, cinerea vel lutescente; umbonibus convexis, depressiusculis.

Latit. 6 — 10 millim.

*Cyclas lacustris*, Draparn. Hist. des Moll. p. 150. t. 10. f. 6, 7. — Lamarck Hist. des anim. s. vert. V. p. 559. — Pfeiff. Land- und Wasserschn. p. 122. t. 5. f. 6, 7.

*Tellina lacustris*, Müll. Verm. Hist. p. 204.

*Animal* album, pellucidum, viviparum (testantibus Müller & Pfeiffer). Siphonum forma fere ut in præcedenti specie, superiore tamen inferiorem longitudine aut æquante aut superante. Branchiæ utrinque geminae, exteriori breviori, ut in cet.

*Testa* orbiculato-rhombea, subinequilatera, postice latior subtruncata, antice magis rotundata, tenuis, pellucida, subtiliter striata, compressa, marginibus (testæ clausæ) acutis. Nates minutæ, acutiusculæ, umbonibus subdepressis.

*Habitat* in fossis & amnibus, passim. In amne Höjeda ad Lund, haud raro.

### 3. *Cyclas calyculata*.

*C. testa orbiculato-rhombea, compressa, tenui, diaphana, tenuiter striata, zona marginali lutescente; natibus protuberantibus, acutiusculis.*

Diam. transv. 6 — 10 millim.

*Cyclas calyculata*, Draparn. Hist. des Moll. p. 130. t.

10. f. 14, 15. — Lamarck Hist. des anim. s. vert.

V. p. 559. — Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p.

122. t. 5. f. 17, 18.

*Testa* orbiculato-rhombea, tenuissima, fragilis, subtiliter striata, nitida, diaphana, compressiuscula, marginibus acutis, pallide cinerea vel cœrulescens, zona marginali lutescente. Nates valde prominentes, tuberculosæ, umbonibus tumidis.

*Habitat* in fossis & paludibus, passim.

\*\* *Testa inæquilatera, transversim subovata; siphone simplici, brevi, cylindraceo.* (PISIDIUM, Pfeiff.).

### 4. *Cyclas obliqua*.

*C. testa ovata, oblique trigona, ventricosa, transversim sulcato-striata; umbonibus obtusis.*

Diam. transv. 9 — 11 millim.

Cy-

*Cyclas obliqua*, Lam. Hist. des anim. s. vert. V. p. 559.

*Cyclas palustris*, Draparn. Hist. des Moll. p. 131. t. 10. f. 17, 18.

*Pisidium obliquum*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 124. t. 5. f. 19, 20. Id. t. 1. f. 19.

*Tellina amnica*, Müll. Verm. Hist. p. 205.

*Animal* album, siphone pallii brevi, apertura parva perforato. Testa animalis aut nuper mortui, aut vi aperta, in parte postica & connata pallii monstrat foramina duo minora, scil. unum juxta latus inferius musculi transversalis, & aliud prope & infra hoc.

*Testa* sub-ovata, vel oblique trigona, inæquilatera, ventricosa, transversim pulchre & distincte striata, umbonibus obtusis, sulcisque 2—3 nigrescentibus notata; præterea extus fusco-lutescens, vel umbonibus pallide cinerascens, marginibus lutescentibus, maculatis. Intus coerulescens. Dentes cardinales utrinque duo, fossula distincti, laterales valvæ dextræ duplicati.

*Junioris testa* albida, fere ovalis, compressa, umbonibus haud prominentibus, quibus notis a sequente dignoscitur, ut etiam marginibus posteriori & superiori magis arcuatis minusque rectis, & striis magis distinctis.

*Habitat* in rivis omnibus & lacubus fundo limoso & arenoso. In Scania passim frequens.

## 5. *Cyclas obtusalis*.

*C. testa ovato-trigona, tumida, inæquilatera, subtilissime striata; natibus prominentibus, margineque subluteo, obtusis.*

Diam. transv.  $3\frac{1}{2}$  millim.

*Cyclas obtusalis*, Lam. Hist. des Anim. s. vert. V. p. 559.

*Pisidium obtusale*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 125. t. 5. f. 21, 22. (Nostra tamen [aliquantum] latior & magis ventricosa).

*Animal* album, viviparum; pulli enim testa tecti inter lamina branchiales haud raro obveniunt. Pallium antice apertum, inferne connatum, postice perforatum, & in siphonem brevissimum vix extra testam protractilem, extensum.

*Testa* ovato-trigona, inæquilatera, latere posteriori brevissimo, obtusissimo, ventricosissima & tumida, nitida, pellucida, subtiliter striata, pallide cinerascens, marginibus plerumque luteis, vel subaurantiis & obtusis. Nates prominentes, obtuse rotundatæ, saturatius plerumque coloratæ.

*Habitat* in amnibus & rivulis passim. In amne Höjeå prope Lund satis frequens.

## 6. *Cyclas fontinalis*.

*C. testa ovali-orbiculata, subdepressa, inæquilatera, substriata; umbonibus vix prominulis; margine acuto.*

Diam. trans. 3 — 4 millim.

*Cy-*



*Cyclas fontinalis*, Lamarck Hist. des Anim. s. vert.  
V. p. 559.

*Pisidium fontinale*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p.  
125. t. 5. f. 15, 16.

Differt a præcedente testa subovali, minus in-  
æquilatera, minus ventricosa, quamvis majori, &  
marginibus (testæ clausæ) acutis.

*Habitat* in fossis & paludibus sylvaticis. Inter  
lignum & corticem truncorum, locis humidis putre-  
scientium, haud raro eam offendimus.

---

## XIX. UNIO. Retz.

*Animal*: Pallium antice & inferne aper-  
tum, postice connatum & apertura subtubi-  
formi gemina perforatum; apertura superi-  
ore minore, inermi, anum terminante, infe-  
riore majore appendicibus subulatis undique  
munita, aquam ad branchias ducente. Pes  
exsertilis, validus, compressus, latus, sublin-  
guæformis.

*Testa* corticata, transversa, æquivalvis, in-  
æquilatera, plerumque crassa, natibus in pleris-  
que decorticatis, sub-erosis. Dens cardinalis  
valvæ dextræ simplex. sinistræ plerumque du-  
plex cum fovea intermedia dextrum excipien-  
te.

te. Dens lateralis vel nullus vel infra ligamentum productus, lamelliformis, in valva sinistra duplex.

\* *Dentibus cardinalibus crassis, subconicis aut angulatis, striatis.*

# 1. *Unio margaritiferus.*

*U. testa ovato-oblonga, inferne coarctato-sinuata, crassa, rudi; natibus depressis; dente cardinali crasso, subconico, striato, laterali (in adultis) nullo.*

Diam. transv. 135. longit. 63 millim.

*Unio margaritiferus*, Retzius, Nova Testaceorum Genera, Lundæ 1788. p. 16.

*Mya margaritifera*, Linn. Faun. Svec. p. 516. — Syst. Nat. p. 1112. n. 29. — Müll. Verm. Hist. p. 210. — *Perlmussla*, Svensk Zoologi I. 6. p. 36. t. 36. (Specimen minus). — *Die Perlenmuschel*, Schröt. Flusseconch. p. 168. t. 4. f. 1. (Figura optima, natibus tamen in nostris aliquantum magis depressis).

*Unio sinuata*, Lamarck Hist. des anim. s. vert. VI. 1. p. 70.

*Unio margaritifera*, Draparn. Hist. des Moll. p. 132. t. 10. f. 8. 16. 19?

*Observ.* Synonymum Retzianum ex specimenibus ab ipso Auctore in Museo Academico Lundensi depositis sumtum est. — Iconem *Schröteri* citatam  
huc

huc pertinere constat tum ex ipsa figura, tum ex eo quod indicat Auctor p. 182 lin. infima \*). Quod igitur de dente laterali affert, p. 170, de dentibus cardinalibus valvæ sinistrae intelligendum est. — At vero Draparn. l. c. tum in descriptione, tum in figuris dentes laterales indicat. An diversa a nostra Species? An Varietas?

*Testa* ovato-oblonga vel sæpius ovali-oblonga, compressiuscula, crassa, ponderosa, cortice nigro transversim striato rudi vestita, curva, interdum subreniformis; margine superiore, a latere inspecto, arcum formante circuli majoris, ab una ad alteram extremitatem ductum; margine inferiore majori vel minori sinu coarctato; extremitate posteriore aliquantum angustiore, subangulata, compressa; anteriore latiore, obtuse rotundata. Nates depressæ decorticatæ & quam maxime erosæ. Intus margaritacea cœrulescens. Dens cardinalis valvæ dextræ validus, crassus, subconicus, obtusus, striatus. Dentes cardinales valvæ sinistrae triangulares vel transversim compressi, striati. Dentes laterales plane nulli, sed margo valvarum infra ligamentum incrassatus, subplanus, sulco interdum levissimo notatus.

*Testa junior* ovalis, neque curvata neque inferne coarctata, compressa, minus crassa & rudis, sub-

ni-

---

\*) Die Perlmuschel hat nur einen einzigen spitzigen Zahn, und statt des langen Seitenzahns erblickt man nur eine Schwüle, und in derselben nur selten einen dünnen fast unmerklichen Einschnitt.

nitida, nigra, margine superiore pone ligamentum in carinam, ab extremitate sinu conspicuo distinctam, compresso. Nates depressæ decorticatæ. Dentes cardinales crassi subtriangulati, striati; dens lateralis minutus, lamelliformis, in valva dextra simplex, in sinistra duplex.

*Obs.* Hanc testam, quamvis primo intuitu distincta videatur, pro juniore *U. margaritifero* habendam puto. Ubique enim obvenit ubi illa reperitur, nec aliæ, quæ pro junioribus *margaritiferis* habeantur, ibidem inveniuntur. Immo in magna testarum copia, quæ jam ad manus sunt, exstant gradatim transitiones quam maxime conspicuæ ab una in alteram formam. Minores ovales sunt vel fere obovatæ, compressæ, subtenuæ, carina pone ligamentum compressissima, sinuata, margine inferiore minime coarctato; dentibus lateralibus minutis lamelliformibus. Sed quo magis crescit testa, eo crassior & rudior fit. Sinus marginis inferioris sensim incipiens, tempore augetur, in adultis quoque variat, jam profundior jam levior. Dentes laterales sensim evanescent, ita ut vix levissima eorum vestigia in adultis restent. Illustr. à LINNÉ, quantum scimus, solus est qui hujus testæ mentionem fecerit, scil. in descriptione *Myæ margaritiferae* (Faun. Sv. p. 516). "Dens lateralis nullus, sed in minoribus crenulatus". — Draparnaudi t. 11. f. 5. quæ pro juniore *U. margaritifero*, ab ipso citatur, nostrum *Un. atrum* melius refert.

Ha-



*Habitat* in fluviis, præsertim majoribus, per totam Scandinaviam, a Scania usque in Lapponiam, passim. Margaritas interdum pulchras & prætiosas inde colligunt Nostrates.

## 2. *Unio elongatus*.

*U. testa transversim oblonga, crassa, rudi, inferne subcoarctata; natibus subprominulis; dente cardinali minuto, subconico; laterali nullo.*

Diam. transv. 78; longit. 33 millim.

*Unio elongata*, Lam. Hist. des anim. s. vert. VI. 1. p. 70?

*Mya margaritifera*, Pen. Brit. Zool. VI. p. 80. t. 43. f. 18.

*Unio margaritifera*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 116. t. 5. f. 11. (At figura nostris major).

*Testa* multo minor quam præcedens, & plerumque angustior minusque curva, margine inferiore minus coarctato aut sinuato, crassa, nigra, rudis, striata. Nates subprominulæ decorticatæ & quam maxime erosæ. Margo superior pone ligamentum minime in carinam compressus, sed rectus & obtusus, extremitate ipsa rotundata. Dentes cardinales minuti, subconici, subacuti, crenulati; laterales plane nulli, margine testæ infra ligamentum subtenui.

*Obs.* Forte non nisi varietas est præcedentis speciei, a vario loco natali orta. *Juniores* nondum vidimus, sed si ex analogia cum specie præcedente ju-

judicare licet, *Unio riparia* Pfeiff. l. c. p. 118. t. 5. f. 13. huc referendus est.

*Habitat* in rivulis, passim. Ad Frödinge Hallandiae in rivo parvulo.

### 5. *Unio ater*.

*U. testa oblongo-ovata, ventricosa, crassa, sub cortice atro nitido argentea; dentibus cardinalibus crassis, angulatis, crenatis: lateralibus lamelliformibus, exsertis.*

Diam. transv. 90; long. 44. millim.

*Unio margaritifera*, junior, Draparn. Hist. des Moll. t. 11. f. 5.

*Animal* griseum, pedis margine lutescente, branchiis griseo-fuscis. Oviparum est uti congeneres. *Ovariola* (sive ovulorum congeries) luteo-rubra, elliptico-elongata, altera extremitate truncata & quasi lacerata, altera acuta, lateribus planis transversim striatis, inter laminas branchiarum inclusa & ita posita ut latera striata sibi invicem aptentur, extremitate truncata superne, altera inferne vergente. Horum ovariorum circa viginti in unaquaque branchia. Ovula numerosissima, minutissima, globosa.

*Testa* oblongo-ovata, margine superiore & inferiore plerumque æqualiter fere curvatis, ventricosa, crassa, præsertim parte inferiore antica crassissima, extus epidermide atra, nitida quamvis striata, vestita, hinc inde decorticata & erosa, ibique argenteo-margaritacea. Nates decorticatæ, depressiusculæ, læ-

læves. Intus margaritaceo-alba ; dentibus cardinalibus crassis, angulatis, plerumque obtusis, crenatis & striatis; dente laterali lamelliformi, exserto, in valva sinistra duplici, sulco interjecto lamellam valvæ dextræ simplicem excipiente.

*Variat* margine testæ inferiore subrecto vel levissime retuso.

*Habitat* in amne Höjeå prope Lund; alibi nondum reperta.

#### 4. *Unio crassus*.

*U. testa ovali, crassa, fusca margine inferiore subretuso; natibus depressis lævibus.*

Diam. transv. 62; long. 34 millim.

*Unio crassus*, Retzius Nov. Testac. Gen. p. 17. n. 2.

(Ex speciminibus originariis in Mus. Acad. depositis).

*Mya testa crassa*, Schröter Flussconch. p. 182. t. 2. f. 2.

*Unio litoralis*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 117. t. 5. f. 12.

*Testa* præcedente minor & minus ventricosa, non ovata sed ovalis, crassa, fusca vel virescens, interdum obsolete radiata; margine superiore magis curvata quam inferiore, qui sæpius aliquantum re-tusus est. Nates depressæ, decorticatæ, læves, extremitati anteriori approximatæ. Dentes cardinales crassi, angulati, striati & crenati; lateralibus lamelliformibus, exsertis.

*Ha-*

*Habitat* in amnibus & rivis vulgaris.

\*\* *Dentibus cardinalibus compressis, cristæformibus.*

# 5. *Unio tumidus.*

*U. testa ovato-oblonga, ventricosa, tumida, postice attenuato-elongata; natibus prominentibus, tuberculatis; umbonibus angulo obtuso a pube utrinque distinctis.*

Diam. transv. 103; longit. 48 millim.

*Unio tumidus*, Retzius Nova testaceor. Gen. p. 17. n.

3. (Ex speciminibus ab ipso Retzio descriptis).

— Spengler Naturhist. Selsk. Skrivt. 3. B. 1. H.

p. 57. n. 24.

An *Unio rostrata*, Lamarck Hist. des anim. s. vert.

p. 77?

*Testa* inter majores sui generis, ovato-oblonga, ventricosa & quasi tumida, crassa, ponderosa, postice sensim attenuata & stricte elongata, extremitate ipsa rotundata, epidermide brunnea vel rufo-fusca, nitente, striis zoniformibus nigricantibus, vestita; nates prominentes, approximatae, tuberculatae, subcoindutae vel saltem minus decorticatae quam in speciebus antecedentibus. Umbones postice angulo obtuso. Pubes in carinam parvulam, utrinque sulco distinctam, margine subrecto, compressa. Dentes cardinales compressi, & tamen validi, (præter anteriorem valvæ sinistræ attenuatum) superius striati, margine crenati vel denticulati; dentes laterales lamelliformes exserti.

*Ha-*



*Habitat* . . . In fluviis Europæ (Retz.). — In lacubus Selandiæ (Spengl.)

*Obs.* Ex speciminibus a cel. RETZIO in Museo Acad. Lundensi depositis hanc speciem descripsimus. In Scaniæ æque ac Selandiæ lacubus sine dubio obvenit, quamvis illam nondum ipsi offendimus.

## 6. *Unio limosus*.

*U. testa ovali-oblonga, plerumque brunnea, posterius elongata, extremitate oblique subtruncata; natibus prominulis, decorticatis; carina pone ligamentum obsoleta, angulo destituta.*

Diam. transv. 75 — 90. millim.

*Unio pictorum*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 115. t. 5. f. 10.

*Obs.* Hanc speciem primus, quantum scimus, clariss. PFEIFFER a specie sequente distinxit & figura optima illustravit. In nominibus tamen utrique additis amicissimum Virum sequi non possumus. Neque enim hanc sed sequentem speciem, quam *U. rostratam* appellat, esse Auctorum *Unionem pictorum*, figuræ ipsius PFEIFFERI egregiæ, satis superque monstrant. — *Unio rostrata*, LAM. quæ utraque major est, & "*testa antcrius (posterius) attenuato-rostrata*" differt, potius ad nostrum *U. tumidum* quam ad hanc speciem pertinet.

Cum sequenti specie maximam habet affinitatem; distincta tamen re vera est.

*Testa*

*Testa* pro magnitudine, semper magis ponderosa, valvis crassioribus, postice productior, ligamento quoque longius producto, antice brevior i. e. natibus extremitati anteriori magis approximatis. Color in omnibus ætatibus saturatior, scil. brunneus seu luteo-fuscus, subnitens, striis zoniformibus, subrugosis, saturatius fuscis, parte testæ posteriore limo semper obducta. Nates decorticatæ, paruum prominulæ, plerumque leves. Carina ligamentalis minuta, fere obsoleta, & margo ejus superior, a latere inspectus, minime angulatus, sed læviter & æqualiter arcuatus, extremitate ipsa angulo obtuso terminata, sive potius oblique subtruncata. Cardo dentibus abbreviatis, obliquis, compressis, crassiusculis, margine crenulato-denticulatis, valvæ sinistræ binis subæqualibus.

*Habitat* in amnibus & rivis, in Scania vulgaris.

## 7. Unio pictorum.

*U. testa ovali-oblonga, luteo-viridi, posterius subrhombeo-attenuata, extremitate subrotundata; natibus prominentibus, tuberculatis; carina pone ligamentum compressa, angulata.*

Diam. 75 — 85 millim.

*Unio pictorum*, Lamarek, Hist. des anim. sans vert. VI.

1. p. 77. — Draparn. Hist. des Moll. t. 11. f. 4.

*Mya pictorum*, Sturm Fauna Germ. VI. 2. fig. a. bona.

*Unio rostrata*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 114. t. 5. f. 8. (fig. bona).

*Var.*

*Var. α. Testa natibus decorticatis, undato-rugosis.*

*Animal* oviparum. *Ovariola* (ovorum congeries) flava, elliptico-elongata, altera extremitate quasi lacerata, lateribus planis lævibus (non striatis).

*Testa* antecedente, pro magnitudine, levior valvis tenuioribus, minus transversim elongatā magisque lata, pallidior, luteo-viridis, subnitida, striis zoniformibus, subrugosis fuscis. Nates prominentes ab extremitate remotiores, plerumque coindutæ, tuberculatæ, tuberculis utrinque bifariam positis. Margo dorsalis in carinam compressus, ex latere inspectus angulo obtuso pone ligamentum notatus. Dens cardinalis utrinque compressissimus in valva sinistra inæqualiter bipartitus, parte posteriori plerumque minori, interdum ferè nulla.

*Habitat* in amnibus & rivis vulgaris.

## 8. *Unio batavus*.

*U. testa ovali, e viridi lutescente, saturatius radiata, posterius latiore, brevi, subrhombea, natibus prominulis, rugosis.*

Diam. transv. 47; long. 25.

*Unio batavus*, Lamarek Hist. des anim. s. vert. VI.

1. p. 78. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 119.

t. 5. f. 14? — Schröter Flussconch. p. 178. t.

3. f. 5. — Draparn. Moll. t. 11. f. 3.

*Testa* ovalis, interdum fere obovata, posterius multo minus producta, sed quam præcedentes latior, subdilatata, carina ligamentali compressa subangulata,

ta, extremitate ipsa angulato-rotundata, extus luteo-viridis, radiis saturatius viridibus, a natibus ad marginem inferiorem & posteriorem decurrentibus, picta; natibus protinulis parvis, parum decorticatis, undato-rugosis; intus citrino-margaritacea, pulcherrime nitens, zonis transversis magis quam in præcedente conspicuis, margine posteriore violaceo. Dentes cardinales abbreviati, compressi, interdum crassiusculi; lateralibus lamelliformibus exsertis.

*Habitat* in annibus & fluviis, rarius. In anne Höjeå prope Lund reperta.

---

## XX. ANODONTA. Brug.

*Animal*: Pallium postice aperturis duabus subtubæformibus: apertura superiore (seu posteriore) minore, inermi, inferiore majore appendicibus subulatis munita. Pes validus, linguæformis, exsertilis.

*Testa* corticata, transversa, æquivalvis, inæquilatera, tenuis; natibus retusis subdecorticatis. Cardo linearis, edentulus.

### 1. Anodonta sulcata.

*A. testa* ovato-oblonga, ventricosa, sulcis transversis inæqualibus, extus & intus conspicuis; mar-  
H
gine



*gine subretuso; umbonibus angulo obtuso utrinque a pube distinctis.*

Diam. trans. 152½; long. 75 millim.

*Anodonta sulcata*, Lamarck Hist. des anim. s. vert.

VI. 1. p. 85. — Schröter Flusssconch. p. 165. t.

2. f. 1.

*Anodonta cellensis*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p.

110. t. 6. f. 1? (Nostra postice magis angustata).

*Anodonta cygnea*, Draparn. Hist. Moll. t. 11. f. 6?

*Testa* inter nostrates, (hucusque inventas) maxima, ovato-oblonga, ventricosa, tumida, tenuis, transversim striata & sulcis inæqualibus, extus & intus conspicuis, exarata, epidermide fusco-virescente tecta, antice latior rotundata, inferne pone medium subretusa, postice elongata, angustata, extremitate ipsa rotundata. Margo superior & posterior in carinam parvulam, obsolete angulatam compressus; pubes angulo obtuso longitudinali utrinque distincta.

*Habitat* in lacubus, passim. Mus. Acad.

## 2. *Anodonta anatina*.

*A. testa* elliptico-ovata, fragili, anterieus rotundata; posterius producta angulata, inferius subretusa; pube compressa, subaurita; natibus extremitati approximatis retusis decorticatis.

Diam. transv. 85 - 95; longit. 46 - 48 millim.

*Anodonta anatina*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. t.

6. f. 2.

*Mye*

*Mytilus anatinus*, Linn. Faun. Svec. edit. 1. n. 1332.

— Pen. Brit. Zool. IV. t. 68. f. 79. — Maton,  
Transact. Lin. Soc. VIII. p. 110. t. 3 A. f. 1.  
(nostrâ multo major).

*Var. α. Testa compressa, tenui, posterius elon-  
gato-producta, subrhombéo-angulata; cari-  
na postligamentali compressissima, aurita.*

*Pen. 1. c. f. 79.*

— *β. Testa antecedenti simili, sed aliquantum  
minus postice producta, minusque com-  
pressa. Pfeiff. fig. cit.*

— *γ. Testa minore, late ovali, dorso posterius  
compresso, angulato. Schröt. Flussconch.  
t. 1. f. 3. — Maton, Lin. trans. VIII.  
t. 3. A. f. 4.*

*Testa* admodum variat, ovato-oblonga vel elli-  
ptico-ovata, jam magis jam minus compressa, tenuis  
& fragilis, epidermide viridi-fusca, transversim in-  
æqualiter striata & rugosa, antè rotundata, in-  
ferius plerumque levissime retusa, posterius magis  
vel minus producta, angulata, margine ligamentali  
in carinam compresso, angulumque obtusum pone  
ligamentum formante, extremitate ipsa oblique sub-  
truncata. Nates juxta rotunditatem extremitatis an-  
terioris sitæ, decorticatæ, umbonibus magis vel mi-  
nus depressis.

*Habitat* in annibus & fluviis vulgaris.

5. *Anodonta piscinalis*.

*A. testa elliptico-ovata, ventricosa, subradiata, antèrius rotundata, posteriùs producta angulata; pube compressa, aurita; natibus prominulis coindutis, ab extremitate remotis, umbonibus tumidis.*

Diam. transv. 105; long. 60 millim.

*Mytilus cygneus*, Schröt. Flussconch. p. 150. t. 3. f. 1.

*Anodonta anatina*, Draparn. t. 11. f. 2.

*Anodonta trapesialis*, Lamarck Hist. des anim. s. vert. VI. 1. p. 87? — Chemn. conch. t. 86. f. 762?

*Testa* elliptico-ovata ventricosa, crassiuscula, antèrius rotunda, posteriùs producta, angulata; epidermide luteo-viridi, interdum pallide lutea, vestita, lineis saturatioribus, confertis, magis vel minus conspicuis radiata, striis transversis & rugis zonæformibus fuscis notata. Margo superior rectus postice in angulum terminatus; pone hunc angulum margo testæ superior & posterior rectus vel concavus, extremitate ipsa truncata. Nates ab extremitate antica remotæ, prominulæ, coindutæ, rubræ, umbonibus tumidis pallide cinereis.

*Obs.* Quoad formam generalem ad antecedentem proxime accedit; differt tamen evidenter testa majori, magis ventricosa, valvisque crassioribus, & præsertim natibus ab extremitate remotioribus, prominulis, umbonibusque tumidis. Cum *Anod. cygnea*, qualis a Pennant, Schröter, Pfeiffer &c. delineatur, confundi vix potest, & ab *Anod. sulcata* magis adhuc dif-

affert. — Quin *Rer. Schröter* l. c. nostram speciem descripserit & delineaverit nulli omnino dubitamus; an vero *Anod. trapesialis, Lam.*, ad quam illustrandam Schröteri fig. cit. adfertur, cum nostra identica sit an diversa, non certi sumus. Nam figura *Chemnitzii* ibidem allata dubia nobis videtur, & ex *Encycloped.* citatas icones consulere non possumus, cum liber in nulla Bibliotheca, nec publica nec privata, apud nos exstat. — Figura *Draparnaldi* citata, sub nomine *Anodontæ anatinæ* formam nostræ speciei egregie exprimit, sed minor est nostris specimenibus.

*Habitat* in piscinis & fossis Scaniæ passim. In fossis turfosis ad *Dagstorp* inventam communicavit amiciss. Dr. *Schagerström*.

#### 4. *Anodonta intermedia.*

*A. testa rhombeo-ovata, compressiuscula, tenuissima, subradiata, anterieus & inferius rotundata; pube compressissima, alato-aurita; natibus retusis.*

Diam. transv. 100; long. 60 millim.

*Anodonta intermedia*, Pfeiffer Land- u. Wasserschn. p. 113. t. 6. f. 3. — Lamarck Hist. des anim. s. vert. VI. 1. p. 86. n. 10. — Chemn. Conch. t. 86. f. 763.

*Testa* tenuissima & fragilissima, ovato-rhombea, compressiuscula, transversim subtiliter striata,  
ru-



rugisque zonæformibus notata, nitida, epidermide luteo-viridi, lineis saturatioribus confertis magis vel minus conspicuis radiata. Margo anterior & inferior rotundati; superior rectus vel subretusus postice compressissimus, angulum obtusum pone ligamentum formans; extremitate ipsa rotundata. Nates retusæ umbonibus subdepressis.

*Habitat* in piscinis & fossis, passim.

### Addenda:

*Pag.* 27.

#### 21. *Helix ericetorum*.

*H. testa subdepressa, umbilicata, striata, alba aut fuscescente, plerumque fasciata; apertura lunato-rotunda, peristomate subpatulo, submarginato, albo.*

*Diam.* 9-10. *altit.* 6-8 millim.

*Helix ericetorum*, Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 38.

t. 2. f. 23. — Sturm Fauna VI. 2. cum fig. —

Drap. Hist. des Moll. p. 107. t. 6. f. 12.

*Obs.* Omnes figuræ citatæ nostris exemplaribus majores sunt. Draparnaldi t. 6. f. 19. 20. (*Helicis striatæ*), quoad magnitudinem & colorem, nostram speciem optime referunt; at nostra minime carinata.

*Variet. α.* Testa fascia unica nigricante, latiuscula, superius conspicua.

— β.

- $\beta$ . *Testa fascia supera latiuscula, infera angusta.*
- $\gamma$ . *Testa fascia supera latiore, inferis pluribus angustis.*
- $\delta$ . *Testa fasciis plane destituta.*

*Testa* subdepressa, interdum planulata, alba vel luteo-suscescens, parum pellucida, striata, vertice lævi subfusco. Anfractus quinque plerumque fasciati, fasciis fuscis vel nigris in anfractu ultimo pluribus vel paucioribus, quarum superior plerumque in ceteris anfractibus juxta suturam continuatur. Apertura fere circularis, segmento parvulo per anfractum penultimum demto. Peristoma subpatulum, acutum, callo complanato albo intus munitum. Umbilicus patulus, profundus, ut anfractus 2-3 in eo conspici possint.

*Habitat* in campis, in lapidosis &c. In insula Oelandia illam passim frequentem invenit & benigne mecum communicavit *Cl. Cand. Phil. B. F. Fries*.

*Pag.* 31.

*Helix rotundata*, var.  $\beta$ . est re vera distincta species; sed ex duobus speciminibus, solis huc usque a me visis, illam determinare non ausim.

*Pag.* 32.

*Helix pygmaea*, var.  $\beta$ . *Testa majori, alba, diaphana.*

*Pag.* 37.

Post diagnosin *Bulimi lubrici*, omissa sunt synonyma:

*Bu-*

*Bulimus lubricus*, Draparn. Hist. d. Moll. p. 75. t. 4.  
f. 24. — Pfeiff. Land- u. Wasserschn. p. 50. t.  
3. f. 7. — Lamarck Hist. des anim. s. vert. VI.  
2. p. 126.

*Helix lubrica*, Müll. Verm. hist. p. 104. n. 303.

Pag. 90.

? *Paludina* . . . . *testa ovato-conica ventri-*  
*cosa, pellucida, perforata; spira acutiuscula anfra-*  
*ctibus quaternis, superius subtruncatis; apertura*  
*ovali-rotunda, labro repando.*

Longit.  $5\frac{1}{2}$  millim.

An *Cyclostoma simile*, Draparn. Hist. Moll. p. 34. t.  
1. f. 15. ? (Nostra ventricosior est).

*Animal* . . . nondum examinavimus.

*Testa* ovato-conica, tenuis, diaphana, pallide  
virescens, tenuissime striata. Anfractus  $4-4\frac{1}{2}$ , te-  
retes, superius subtruncati, infimo ceteris multo ma-  
jori, testam ventricosam efficiente. Apertura ovali-  
rotunda, neque angulata, neque ab anfractu penul-  
timo excisa; peristoma acutum, labro in medio pro-  
ducto. Fissura umbilicalis satis conspicua.

*Habitat* in fluviis. In amne *Höjeå* reperta.

*Obs.* Distinctissima ab omnibus hinc descriptis  
est species. Unicum tantum testæ specimen, ani-  
mal vero nullum examini subjeci. Testa quoad for-  
mam externam *Paludinam* refert; apertura vero  
& cavitas spiralis de *Valvata* monet.

# INDEX

## *Generum et Specierum.*

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ACHATINA. pag. 38.          | — peregrum 67.                |
| — Acicula 38.               | — stagnale 60.                |
| AMPHIPEPLEA p. 58.          | — truncatulum 72.             |
| — glutinosa 58.             | BULIMUS 36.                   |
| ANCYLUS p. 83.              | — acicula 36.                 |
| — fluviatilis 84.           | — hordeaceus 36.              |
| — lacustris 83.             | — lubricus 37.                |
| ANODONTA pag. 113.          | — obscurus 36.                |
| — anatina 114. 116.         | <i>Bulla</i> fontinalis 56.   |
| — cellensis 114.            | — Hypnorum 57.                |
| — intermedia 117.           | <i>Carocolla</i> lapicida 28. |
| — piscinalis 116.           | <i>Carychium</i> minimum 56.  |
| — sulcata 113.              | CLAUSILIA 42.                 |
| — trapesialis 116.          | — bidens 43.                  |
| AURICULA p. 54.             | — biplicata 46.               |
| — minima 55.                | — papillaris 44.              |
| <i>Buccinum</i> Acicula 38. | — plicatula 45.               |
| — auricula 62.              | — rugosa 46.                  |
| — glabrum 71.               | CYCLAS 95.                    |
| — glutinosum 58.            | — calyculata 99.              |
| — palustre 70.              | — cornea 96.                  |

— fon-



- fontinalis 101.
- lacustris 98.
- obliqua 100.
- obtusalis 101.
- palustris 100.
- rivalis 96.
- rivicola 98.

*Cyclostoma acutum* 92.

- impurum 90.
- obtusum 86.

HELIx pag. 13.

- aculeata 16.
- albella 29.
- arbustorum 18.
- auricularia 62.
- balthica 65.
- bidens 43.
- bidentata 14.
- cellaria 32.
- complanata 82.
- conspurcata 25.
- contorta 74.
- cornea 75.
- costata 30.
- crystallina 35.
- Ericetorum 118.
- fragilis 61.
- fruticum 22.
- fulva 15.
- hispida 26.
- hortensis 21.

- incarnata 24.
- Lapieida 28.
- limosa 72.
- lubrica 37.
- lucida 34.
- memorialis 19.
- nitida 33. 34.
- nitidula 33.
- obscura 36.
- octona 92.
- papillaris 44.
- pellucida 11.
- perversa 48.
- piscinalis 86.
- planorbis 80.
- Pomatia 17.
- pulchella 29.
- putris 41.
- pygmæa 32.
- rotundata 30.
- spirorbis 78.
- stagnalis 60.
- strigella 23.
- succinea 41.
- tentaculata 90.
- vivipara 88.
- vortex 79.

LIMAX p. 1.

- agrestis 8.
- albus 2.

**LIMAX ater** 1.

- - var.  $\beta$ . Müll. 2.
- cinereo-niger 7.
- cinereus 6.
- fasciatus 3.
- flavus 5.
- rufus 3.
- subfuscus 4.
- tenellus 10.

**LYMNEA** p. 60.

- auricularia 61, 62.
- balthica 64.
- elongata 71.
- fusca 70.
- leucostoma 71.
- minuta 72.
- ovata 63.
- palustris 69.
- peregra 66.
- stagnalis 60.
- succinea 66.
- vulgaris 63.

**Mya margaritifera** 103. 106.

- pictorum 111.
- testa crassa 108.

**Mytilus anatinus** 115.

- cygneus 116.

**NERITINA** pag. 92

- fluviatilis 93.

**Nerita fluviatilis** 93.

- Jaculator 90.
- piscinalis 86.
- pusilla 86.
- vivipara 88.

**PALUDINA** pag. 88.

- balthica 91.
- impura 89.
- octona 92.
- vivipara 88.

**Patella fluviatilis** 84.

- lacustris 84.

**PHYSA** pag. 55.

- fontinalis 56.
- Hypnorum 57.

**Pisidium fontinale** 102.

- obliquum 100.
- obtusale 101.

**PLANORBIS** pag. 73.

- albus 76.
- carinatus 81.
- contortus 73.
- corneus 74.
- deformis 79.
- hispidus 75.
- imbricatus 76.
- marginatus 80.
- Purpura 74.
- similis 75.

PLANORBIS spirorbis 78.

— umbilicatus 80.

— vortex 79.

— - β. Drap. 78.

PUPA pag. 48.

— anti-vertigo 52.

— costulata 51.

— Doliolum 51.

— fragilis 48.

— marginata 49.

— muscorum 49. 50.

— pygmæa 53.

— vertigo 53.

SUCCINEA 41.

— amphibia 41.

Tellina amnica 100.

— cornea 96.

— lacustris 98.

— rivalis 96.

UNIO pag. 102.

— ater 107.

— batavus 112.

— crassus 108.

— elongatus 106.

— limosus 110.

— litoralis 108.

— margaritifera 103. 106.

— pictorum 110. 111.

— riparia 108.

— rostrata 109. 111.

— sinuata 103.

— tumidus 109.

VALVATA pag. 85.

— cristata 87.

— obtusa 85.

— piscinalis 85.

— planorbis 87.

VITRINA pag. 10.

— beryllina 11.


— pellucida 11.


# CORRIGENDA.

Pag.	XIV.	lin.		continuo	lege	continue
—	11	—	13	Helicini	—	heliciformes
—	12	—	1	in	—	supra
—	13	—	1	induebatur	—	induebat
—	—	—	10	adde: Diam.	1	millim.
—	—	—	14	Testa	—	Testa minima
—	68	—	23	obsoletissima	—	plerumque obsoletis- sima
—	85	—	16	circulari	—	rotundata
—	90	—	20	sat	—	haud
—	91	—	10	identica	—	identicum
—	92	—	19	actonam	—	octonam









3 2044 072 246 630

